약물유전학 소개

서울대학교 의과대학 약리학교실 및 서울대학교병원 임상약리실

장 인 진

Introduction to Dlinical Pharmacogenetics

In-Jin Jang, MD, PhD,

Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology Unit Seoul National University
College of Medicine, and Hospital, Seoul, Korea

서 론

약물유전학(pharmacogenetics)은 이미 50년 전인 1950년대에 quinine에 의한 용혈성 빈혈이 G6PD deficiency 환자에서 더 흔하다는 것과 1960년대에 isoniazid의 acetylation이 slow/rapid acetylator로 나누어 진다는 것 등을 통해 확립되어 twin study (Figure 1), pedigree study 등의 방법론을 이용하여 유전적인 요인에 의한 약물반응의 개체간 차이 즉 약물의 효과, 부작용의 차이를 연구하였으며 최근에는 분자생물학 및 유전체학 연구방법을 통해 그 응용 범위가 확대되고 그 중요성이 강조되고 있다. 현재 약물유전체학(pharmacogenomics)은 약물유전학과 유사한 의미로 이용되고 있으며 다양한 omics 방법론을 이용하여 약물반응의 개인차와 약물 작용의 target을 연구하는 분야이다.

약물유전체학의 임상적인 이용은 한마디로 "맞춤약물/맞춤치료 (tailored medicine/individualized drug therapy)", 즉 유전적인 요인을 고려하여 개개인에 가장 적절한 약을 가장 적절한 용량으로 투여하는 것이다. 즉 (1) 유전적인 원인에 의한 약동학 및 약력학 특성의 개인차 확인; (2) 약물에

반응하는 사람과 반응하지 않는 사람의 확인; (3) 유전적인 요인을 검사하여 약물의 유효성 및 독성을 예측함으로써 가장 효과적이고도 부작용이 적은 약과 용량/용법을 미리 결정하는 것이다.

약물의 작용은 체내의 약물농도 변화를 결정하는 약동학적인 특성과 약물의 작용부위 주로 수용체에서 약물-반응 관계인 약력학 특성에 의해 결정된다. 따라서 약동학에 영향을 미치는 약물 대사 효소나 수송체(transporter)의 표현형(phenotype) 또는 유전형(genotype) 분석에 의한 개별화된 맞춤형약물요법의 가능성은 커지고 있다. 유사하게, 수용체의 다형성도 약물의 농도(용량)-반응 관계에 영향을 미쳐 약물효과의 개체간 차이에 영향을 미친다. 그러므로 적어도 약동학/약력학 두 가지 측면을 고려한 약물의 선택과 용법의 결정이 필요하다. (Figure 2, 3).

약물유전체학 연구에는 high-throughput DNA microarray 방법, SNP(single nucleotide polymorphism) 분석법, CNV(copy number variation) 분석법, 등 유전형 검사방법, 그리고 이들 대용량 유전자 정보의 분석법, 유전형의 기능을 *in vitro* 또는 동물에서 평가하는 표현형 확인 연구, 인체를 대상으로 한 약동학 및 약력학 임상연구, 유전적

교신저자: 장 인 진

서울시 종로구 연건동 28 (110-799), 서울대학교 의과대학 약리학교실 및 서울대학교병원 임상약리학과

전화번호: 02-740-8290, 팩스: 02-742-9252, E-mail: ijjang@snu.ac.kr

Figure 1. 약물의 반감기에 미치는 유전적인 영향.

변이에 따른 약물의 임상효과를 평가하거나 부작용의 차이를 평가하는 전향적인 임상연구, 유전체 이용 역학연구 등이 중요한 연구 방법이 된다. 유전형으로는 SNP가 가장 많이 이용되고 있다. SNP 외에도 CNV, insertion, deletion, 등의 유전형이 약물반응의 다형성과 관련이 있다.

많은 경우 genotype-to-phenotype의 연구 형태(candidate gene approach)로 연구가 이루어지게 되지만 약물 유해반응과 같은 경우는 phenotype-to-genotype의 연구가 필요하다. 특히 이 경우 전체 게놈을 분석하는 연구방법의 적용이 필요하게 된다. 또한 생물정보학이나 약동/약력 모델링 등이 이들 연구 결과와 각종 임상정보를 통합하여 실제 환자의 약물요법에 적용할 수 있는 방법을 개발하는데 이용될 수 있다. 또한 약물유전학 연구결과의 응용에서 필수적이 것은 유전형 진단을 위한 간편한 방법의 개발이다. 이외에도 신약의 개발과 관련하여 유전적 변이의 연구를 통한 새로운 target의 발견과 gene expression profiling을 통해 약물작용의 분자수준의 기전 확인, 약물-질환 상호작용 등

의 연구에 활용할 수 있으며 더 나아가 신약후보 물질의 확인이나 약물의 약리작용과 독작용의 지표인 바이오마커(생체표지자)로 이용될 수 있다.

유전적인 요인에 의한 약동학의 개인차

1) 약물대사: Phase I 대사 효소

(1) 시토크롬 P450 일산화효소(cytochrome P450 monooxygenase)에 의한 대사

약물을 복용하지 않는 건강한 사람에서, 시토크롬 P450에 의한 약물대사 속도의 주요 결정인자는 유전적인 것이다. 간의 형질내세망에는 서로 다른 기질특이성을 가진 시토크롬 P450 동종효소족이 있다. 많은 약물들이 한 가지 이상의 효소에 의해 산화대사과정을 거치며, 이들 산화대사효소들과 다음 단계의 축합효소, 수송체단백 등의 활성이 복합적으로 작용하여 항정상태의 혈중농도가 결정된다. 만약 어떤 약물이 여러 경로를 통하여 대사되고, 많은 수의 유전자에 의해 효소활성이 조절된다면, 청소율과 항정상태 농도의 분포는 단봉분포(unimodal distribution)를 이루는 경향이 있다. 클로르프로마진의 경우처럼 개인간의 효소 활성 차이가 10 배 이상일 수 있지만, 치료초기에 이를 예측할 방법은 없다.

어떤 대사 경로는 쌍봉 혹은 삼봉 분포를 보이는데, 이는 주로 단일 유전자에 의해 효소의 활성이 조절됨을 암시하며, 이들 유전자의 다형성이 확인되는 경우가 많다. 다수의 사람들은 광범위대사집단(extensive metabolizer, EM)이며, 소수는 대사능이 낮은데 이를 빈약대사집단(poor metabolizer, PM)이라 부른다. 효소능이 결핍된 유전자의 이형접합체나 효소의 활성이 결핍은 아니지만 감소한 유전형의 동형접합체인 사람은 중등도대사집단(intermediate metabolizer, IM)으로 분류될 수도 있다. 유전자를 2배체 이상 가진 사람들은 초신속대사능(ultrarapid metabolism)을 보이기도 한다.

Figure 2. 유전적인 요인에 의한 약물반응의 개체차이는 약동학/약력학에서의 유전적 다형성에 의해 결정된다.

이러한 다형성은 단일 대사 경로를 가지거나 단일 대사 경로가 지배적인 약물들에서 큰 임상적 의미를 갖는다. PM 표현형의 임상적 결과는 약물의 축적이나 또는 활성형 대사체의 부재로 인한 것이다. (Table 1)

시토크롬 P450의 동종효소인 CYP2D6은 유전적 다형성을 보인다. CYP2D6은 많은 약물의 주 대사 경로인데, 부정맥 치료제(프로파페논, 프레카이니드), 베타 수용체 차단제(티몰올, 메토프롤올, 알프

레놀올), 삼환계 항우울제(노르트리프틸린, 데시프라민, 이미프라민, 클로미프라민), 신경이완제(페르페나진, 치오리다진, 혹은 할로페리돌), 선택적 세로토닌 재흡수 차단제(플루옥세틴, 파록세틴), 그리고 코데인, 텍스트로메토르판과 같은 몇몇 아편류를 포함한다. 따라서 코데인의 경우에는 PM환자에서 활성형 대사체인 모르핀으로 잘 전환되지 않으므로 진통 효과가 훨씬 작게 나타난다. 역으로 CYP2D6 유전자를 몇 배체로 가진 환자에서는 효

Figure 3. 유전형에 따른 약물의 선택과 용량의 조절

Figure 4. CYP2D6 대사능의 분포

과가 지나치게 나타난다. PM유전형을 가진 환자에게 베타 수용체 차단제인 티몰롤 점안액을 투여하면 효과가 크게 나타난다. 사람에서 CYP2D6의 효소활성도는 탐지(probe) 약물인 데브리소퀸(거의 전적으로 CYP2D6을 통해 대사됨)을 이용하여 측

정할 수 있다. PM 표현형은 기능이 결핍된 CYP2D6을 생산하는 대립 유전자를 검색하는 유전형 검사로도 확인할 수 있다. PM 표현형의 빈도는 민족(ethnicity)에 따라 다른데, 백인의 경우에는 5-10%, 아시아인에서는 이보다 낮은 1-2% 정도의

Figure 5. CYP2D6의 기질 약물인 Nortriptyline의 혈중 농도가 CYP2D6 유전형에 따라 큰 차이를 보인다.

빈도를 보인다. (Figure 4, 5)

CYP2C19 동종형도 다형성을 보이는데, 처음 메

페니토인의 수산화(hydroxylation)에서 발견되었으며, 현재도 메페니토인은 CYP2C19의 기능을 측정하는 탐지(probe) 약물이다. 이 효소는 오메프라졸, 프로구아닐, 디아제팜, 시탈로프라미의 주요 대사 경로를 담당한다. CYP2C19의 다형성에 의한 효과는 유전형에 따른 오메프라졸 치료효과로부터 잘 알려졌다. 오메프라졸(아목시실린과 함께 20mg을 투여시)의 헬리코박터 파이로리 치료 효과를 보면 EM 유전형의 경우에는 완치율이 29%로서 PM의 100% 완치에 비해 치료효과가 크게 줄어든다. 이것은 오메프라졸의 권장 용량(20mg)에서 CYP2C19 EM의 경우 위산 분비 억제와 궤양 치료 효과가 상대적으로 적은 것을 반영한다. 환자의 CYP2C19의 유전형을 알면 프로톤 펌프 저해제 치료에 도움이 된다. 메페니토인의 수산화 결핍 빈도는 백인의 경우 3-5%인 반면, 한국인, 일본인 및 중국인의 경우에는 20%정도이다. 이런 PM 빈도의 차이에 따라 인구집단의 평균 대사능에서도 인종간의 큰 차이를 보인다. (Figure 6, Table 1)

Figure 6. CYP2C19의 PM 빈도에 따라 EM의 평균 diazepam 청소율과 혈장 농도에서 인종간 차이를 보인다.

Table 1. Phase I 대사 효소의 유전적 다형성

Drug-Metabolizing Enzyme	Frequency of Variant Poor-Metabolism Phenotype	Representative Drugs Metabolized	Effect of Polymorphism
Cytochrome P-450 2D6(CYP2D6)	6.8% in Sweden 1% in China ¹⁷	Debrisoquin ¹⁵ Sparteine ¹⁶ Nortriptyline ²³ Codeine ^{27,28}	Enhanced drug effect Enhanced drug effect Enhanced drug effect Decreased drug effect
Cytochrome P-450 2C9(CYP2C9)	Approximately 3% in England ²⁹ (those homozygous for the *2 and *3 alleles) 2.7% among white Americans ³³	Warfatin ^{29,30} Phenytoin ^{31,32}	Enhanced drug effect ²⁹⁻³²
Cytochrome P-450 2C19(CYP2C19)	3.3% in Sweden 14.6% in China ¹⁷ 18% in Japan ³³	Omeprazole ^{34,35}	Enhanced drug effect ^{36,39}
Dihydropyrimidine dehydrogenase	Approximately 1% of population is heterozygous ³⁸	Fluorouracil ^{39,40}	Enhanced drug effect ^{39,40}
Butyrylcholinesterase (pseudocholinesterase)	Approximately 1 in 3500 Europeans ⁴¹	Succinylcholine ^{9,41}	Enhanced drug effect ^{9,41}

*Examples of genetically polymorphic phase I enzymes are listed that catalyze drug metabolism, including selected examples of drugs that have clinically relevant variations in their effects.

CYP2C9은 와파린과 페니토인 대사의 주요경로를 담당한다. 이 효소를 생산하는 대립 유전자들 중에는 기능을 소실한 것들이 있다. 이런 유전자는 매우 적은 용량의 와파린만 요구하므로 초기 치료가 어렵고, 출혈의 위험이 증가한다. 유사하게 기능이 없는 CYP2C9를 생산하는 대립유전자를 가진 사람에서는 고농도의 페니토인으로 인해 약물 유해반응(부작용)이 잘 일어난다.

약물 대사능의 다형성은 특히 해당 효소가 약물 제거의 주경로일 때 약물 처리에 큰 개인간 차이를 초래한다. 예를 들어, 메페니토인을 경구로 투여하면 EM과 PM 표현형을 가진 사람간에 100~200배의 청소율 차이가 존재한다. 결과적으로 PM 환자에서는 EM 환자에 비하여 경구투여시의 청소율이 매우 낮고 생체이용률이 훨씬 높아서 최고혈장농도와 평균 농도가 크게 나타나게 된다. 즉 PM 환자에게 상용량을 투약하였음에도 불구하고 약물농도가 지나치게 상승하므로 효과가 과다하여

독성을 나타내기 쉽다. 약물 대사의 다형성을 보이는 경우에 약물요법의 개인별 적정화는 특히 중요하다. NAT-2, CYP2D6, CYP2C19 등의 유전자형 검사가 점점 더 일반화됨에 따라 약물요법의 개인별 적정화에 유용하게 사용될 것이다.

(2) 기타 Phase I 대사효소

Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) 효소는 항암제인 5-FU의 불활성화에 중요한 효소이다. 이는 1980년대 중반 일상적인 용량에서 치명적인 중추신경계 독성을 보인 환자에서 처음 발견되었다. (Table 2)

2) 약물대사: Phase II 대사효소

(1) Thiopurine S-methyltransferase(TPMT)

아자치오프린(azathioprine)의 대사는 효소의 유전적 다형성의 임상적인 중요성을 보여주는 대표적인 예이다. 아자치오프린은 그의 활성형 대사체인 6-머캅토피린(6-mercaptopurine)을 통하여 먼

Table 2. Phase II 약물대사 효소의 유전적 다형성

Drug-Metabolizing Enzyme	Frequency of Variant Poor-Metabolism Phenotype	Representative Drugs Metabolized	Effect of Polymorphism
N-Acetyltransferase 2	52% among white Americans ¹⁰ 17% of Japanese ⁵⁸	Isoniazid ¹⁰ Hydralazine ¹¹ Procainamide ¹²	Enhanced drug effect ¹³
Uridine diphosphate-glucuronosyltransferase 1A1(TATA-box polymorphism)	10.9% among whites ⁵⁹ 4% of Chinese ⁶⁰ 1% of Japanese ⁶⁰	Irinotecan ⁶¹ Bilirubin ⁶²	Enhanced drug effect ⁶³ Gillber's syndrome ⁶²
Thiopurine S-methyltransferase	Approximately 1 in 300 whites ^{50,57} Approximately 1 in 2500 Asians ⁵⁷	Mercaptopurine ⁵¹ Azathioprine	Enhanced drug effect(toxicity) ⁵¹⁻⁵³
Catechol O-methyltransferase	Approximately 25% of whites ^{51,64}	Levodopa ^{51,65}	Enhanced drug effect ^{51,65}

*Examples of genetically polymorphic phase II(conjugating) enzymes are listed that catalyze drug metabolism, including selected examples of drugs that have clinically relevant variations in their effects.

억 억제 효과를 나타낸다. 표적 세포내에서 6-머캅토피린의 주 비활성화 대사경로는 TPMT에 의한 것이다. 이 효소의 유전적 다형성은 6-머캅토피린의 비활성화와 이에 따른 아자치오프린의 독성 및 치료효과의 환자별 차이에 큰 영향을 미친다. 활성이 결핍된 TPMT를 생산하는 대립 유전자를 동형 접합체(homozygote)로 가진 사람은 서양인 전체 인구의 0.3 내지 1%를 차지하고 아자치오프린 상용량에서 심각한 범혈구감소증을 가져온다. 활성이 결핍된 TPMT 대립 유전자를 하나 가진 이형 접합체인 사람도 상용량에서 과도한 골수 억제를 가져온다. 치료적 관점에서 보면 이러한 이형 접합체를 가진 사람들이 존재함으로써 경험적인 상용량이 낮게 결정되고, 따라서 정상적인 TPMT 동형 접합체 사람들 입장으로는 부적절하게 적은 용량이 투약받게 된다. TPMT 효소 기능 결핍은 적혈구 TPMT 효소능을 측정함으로써 알 수 있다(최근 2 개월 이내 수혈이 없었던 경우). 유전형은 표현형과 좋은 일치도(>95%)를 보이므로 유전형 검사가 치료의 개인별 적정화, 즉 아자치오프린(그리

고 6-머캅토피린)의 향후 치료용량 결정에 활용될 수 있을 것이다.

(2) 아세틸화(Acetylation)

이소니아지드, 히드랄라진, 설폰아미드류, 프로카인아미드와 다수의 약물들은 히드라지노기 또는 아미노기의 아세틸화에 의해 대사된다. 이 반응은 N-아세틸 전이효소-2(NAT-2)에 의해 촉매되는데, 이 효소는 간 세포질속에서 아세틸기를 아세틸 Co-A를 통해 약물로 전달한다. NAT-2 유전자의 다형성에 의해 약물의 아세틸화 속도는 개인 간 큰 차이를 보이므로, “신속 아세틸화군(rapid acetylator)”과 “지연 아세틸화군(slow acetylator)”의 2개 봉우리를 갖는 쌍봉분포(bimodal distribution)를 보인다.

아세틸화 표현형은 아세틸화 효소의 기질인 덤손, 카페인, 설파메타진과 같은 탐지(probe) 약물을 일정 용량 투여 후 혈장 또는 소변에서 측정된 대사 이전 형태와 아세틸화 형태로 된 약물의 비율을 이용하여 결정할 수 있다. 표현형 검사를 통하여

Figure 7. MDR1의 유전형에 따른 P-glycoprotein 활성의 개인차로 인해 기질인 digoxin, fexofenadine과 같은 약물의 장관을 통한 흡수, 담즙을 통한 배설 등의 과정에서 개인차를 보이게 된다.

지연(slow), 중도(intermediate), 신속(rapid) 아세틸화 군으로 구분할 수도 있다. 혈중 백혈구에서 얻은 유전체 DNA를 이용해서도 지연 아세틸화 군을 찾아낼 수 있다.

3) 약물수송체

장관에서 약물의 흡수, 담즙과 신장에서 배설 등 약물의 수송 과정에 작용하는 것은 다양한 수송단백들로 이들은 크게 ATP를 이용하는 ATP-

Table 3. 약물작용 수용체의 유전적 다형성

Gene	Gene Product	Medication	Drug Effect Associated with Polymorphism
	Ace	ACE inhibitors (e.g., enalapril) Fluvastatin	Renoprotective effects, blood-pressure reduction, reduction in left ventricular mass, endothelial function ³²⁻⁴⁰ Lipid changes(e.g., reductions in low-density lipoprotein cholesterol and apolipoprotein B): progression or regression of coronary atherosclerosis ⁴¹
	Arachidonate 5-lipoxygenase	Leukotriene inhibitors	Improvement in FEV ₁ ⁴²
	β ₂ -Adrenergic receptor	β ₂ -Agonists(e.g., albuterol)	Bronchodilatation, susceptibility to agonist-induced desensitization, cardiovascular effects ⁴³⁻⁵⁰
	Bradykinin B2 receptor	ACE inhibitors	ACE-inhibitor-induced cough ⁵¹
	Dopamine receptors(D2, D3, D4)	Antipsychotics(e.g.haloperidol, clozapine)	Antipsychotic response(D2, D3, D4), antipsychotic-induced tardive dyskinesia(D3), antipsychotic-induced acute akathisia(D3) ⁵²⁻⁵⁶
	Estrogen receptor- α	Conjugated estrogens Hormone replacement therapy	Increase in bone mineral density ⁵⁷ increase in high-density lipoprotein cholesterol ⁵⁸
	Glycoprotein IIIa subunit of glycoprotein IIb/IIIa	Aspirin or glycoprotein IIb/IIIa inhibitors	Antiplatelet effect ⁵⁹
	Serotonin(5-hydroxytryptamine)transporter	Antidepressants(e.g., clomipramine, fluoxetine, paroxetine)	5-Hydroxytryptamine neurotransmission, antidepressant response ⁶⁰⁻⁶²

*The examples shown are illustrative and not representative of all published studies, which exceed the scope of this review. ACE denotes angiotensin-converting enzyme, and FEV₁ forced expiratory volume in one second.

binding cassette (ABC) 군과 촉진(facilitator) 수송체인 solute carrier (SLC) 군으로 나누며 ABC 군에는 소수성 음이온을 주로 수송하는 MRP1,2와 친수성 양이온과 지질을 수송하는 MDR, 등이 있고 유기 양이온 수송체인 OCT1,2,3와 신경전달물질 수송체인 DAT, NET, GAT1, 그 외 ENT/CTN, DEP, CTR 등이 SLC 군에 속한다. 이들 중 항암제의 다약제 내성으로 처음 알려진 MDR1의 유전적인 다형성 연구가 가장 많이 이루어져 있다. (Figure 7)

유전적인 요인에 의한 약력학/약물반응의 개인차

약물효과의 개인간 차이를 밝히는 데 질환의 분자적 기전을 밝히는 것은 중요한 역할을 한다. 인체 생리에서 특정 유전자 산물의 역할에 대해 밝히고자 하는 분자적인 접근은, 유전자 산물(주로 효소)의 발현이나 기능을 변화시키는 다형성을 인식시키는데 도움이 되고 있다. 인간 게놈에서 약 1000 염기쌍마다 1개 정도의 빈도로 다형성이 존

제한다고 추정되고 있다. 이러한 유전자(또는 그 산물)는 역시 약물과 작용하여 좋은 효과나 독성을 나타내는 목표 분자인 경우가 많다.

게놈 전체를 조사한 결과 가족적 조기 알츠하이머 질환은 APOE 유전자와 연관되어 있음을 밝혔다. 특별히 APOE 유전자의 E4 대립유전자는 좋지

Figure 8. 베타2 수용체 다형성에 따른 베타2 효현제에 의한 기관지 확장 반응의 차이.

않은 예후와 연관되어 있으며, 콜린 아세틸 전달효소 발현의 저하 때문이라고 여겨진다. 더군다나 콜린 아세틸 전달효소 저해제인 타크린의 효과는 APOE2, APOE3 대립유전자를 가진 사람들에서 더 잘 나타나는 것으로 보인다. 퀴니딘과 같이 활동전위를 연장시키는 약물에 대하여 현저한 QT간격 연장과 다형성 심실 빈맥(torsade de pointes) 반응을 일으키는 것을 “특이체질(idiosyncratic)” 때문이라고만 생각하였었다. 생리적인 심근세포의 재분극을 담당하는 이온 통로 단백질의 유전자가 밝혀지면서 정상 심근의 재분극에 대한 분자 수준의 이해가 증가하였다. 이런 유전자들의 돌연변이들이 연장 QT 증후군 같은 선천성 부정맥 증후군을 야

기하며, 이온 통로를 막는데, 이것이 약물에 의한 QT 간격 연장과 공통된 기전이다. 이러한 유전자들에 돌연변이를 가진 환자들은 임상적으로 증후가 나타나지는 않은 상태로 있다가 약물이 투여되면 증후를 나타내는 것이다.

Table 3와 같이 약물이 작용하는 수용체나 신호 전달(signal transduction) 과정의 유전적 다형성이 알려지고 있다. 많은 다형성이 확인된 베타2-아드레날린성 수용체는 천식이나 울혈성 심부전과 관련된 것으로 보이며, 이들의 예후를 결정할 것이다. 베타2 수용체의 다형성은 베타2 수용체 효현제(agonist)에 대한 반응을 결정하는 것으로 보인다. (Figure 8)

Table 4. 낮은 효소활성과 연관된 유전형에서 나타나는 약물이상반응의 예

P450 enzyme	Druga	Adverse reaction
CYP1A2	Typical antipsychotics	Tardive dyskinesia
CYP1A2	Warfarin Tolbutamide Phenytoin	Haemorrhage Hypoglycaemia Phenytoin toxicity
CYP1A2	Mephenytoin Diazepam	Neurotoxicity Prolonged sedation
CYP1A2	Antiarrhythmics β -Blockers Tricyclic antidepressant Opioids Phenformin Perhexilene	Arrhythmias Bradycardia Confusion Dependence Lactic acidosis Hepatotoxicity
CYP1A2	Anti-leukaemic agents	Treatment-related leukaemia
Phase II enzyme	Drug	Adverse reactiona
Plasma butyrylcholinesterase	Succinylcholine	Prolonged apnoea
N-acetyltransferase	Sulfonamides Amonafide Procainamide, hydralazine, isoniazid	Hypersensitivity Myelotoxicity SLE
Thiopurine methyltransferase	6-Mercaptopurine, azathioprine	Myelotoxicity, treatment-related second tumours
Dihydropyrimidine dehydrogenase	5-Fluorouracil	Myelotoxicity
UDP glucuronosyl transferase 1A1	Irinotecan	Diarrhoea, myelosuppression

Table 5. 와파린 용량과 유전형

유전형, %	환자 분포, %		지역사회 타환자군, %
	1.5 mg/d 이하	1.5 mg/d 이상	
CYP2C9 *1/*1	19	62	60
*1/*2	33	17	20
*1/*3	28	19	17
*2/*3	14	0	2
*2/*2	6	2	0
*3/*3	0	0	1

와파린 용량과 유전형. CYP2C9 유전형의 분포를 일일 1.5 mg 이하와 이상으로 유지 되는 환자들과 주위 지역사회(communitiy)의 유사한 환자에서 비교하였다. *1, *2, *3는 각각 유전형이다. 일일 용량이 1.5 mg 이상으로 유지되는 환자는 지역사회의 타환자군과 유사한 분포를 보였으나 1.5 mg 이하인 환자들은 *1/*1이 아닌 유전형이 더 많았다. 출처: Aithal 등. Lancet. 1999 Feb 27;353(9154):717-9

유전적인 요인에 의한 약물이상반응의 개인차

약물의 대사과정은 개인차가 상당히 있으며 그로 인해 약물농도의 차이가 나타난다. 대부분의 약물은 간이나 장에 있는 시토크롬 P450 (CYP)에 의해 산화된다. 이들 효소 중 일부는 유전적인 다형성(polymorphism)을 보여 약물대사활성이 없거나 낮고 결과적으로 농도의존적인 독성을 보이게 된다. 반대로 독성이나 약리효과가 대사체에 의해 나타나는 경우에는 효소활성이 낮은 사람에서 약효가 적게 나타나고 유전적으로 활성이 높은 사람에서 약효가 크게 나타난다. 이러한 다형적인 산화효소활성을 보이는 예가 CYP2D6, CYP2C9, 그리고 CYP2C19이다. (Table 4)

대사능이 낮은(poor metabolizer) 표현형에 의해 나타나는 임상양상이 이제는 더 명확히 밝혀지고 있으며 이는 약물농도가 과다하게 높아져 나타나는 것이다. 와파린(warfarin)의 경우 활성이 높은 S 이성질체(isomer)가 다형성을 보이는 CYP2C9에 의해 대사된다. CYP2C9의 낮은 효소활성과 연관된 이형접합체(heterozygote)나 동종접합체(homozygote) 대립유전자(allele)를 가진 사람은 와파린

의 청소율이 낮고 따라서 높은 농도를 보인다. 최근 이 다형성의 임상적인 의의가 항응고요법 클리닉에서 환자 추적연구를 통해 밝혀졌다. 와파린 일일 용량이 1.5 mg 이하로 유지되는 환자들은 정상인 인구집단이나 높은 와파린 용량으로 유지되는 환자군에 비해 낮은 대사능 유전형(genotype)이 더 높은 빈도로 나타났다(Table 5). 게다가 낮은 용량으로 유지되는 군에서는 초기의 과다한 항응고효과나 출혈의 이상반응이 더 흔히 나타났다. CYP2C9의 다형성에 와파린의 작용점인 vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1)의 유전적 다형성을 포함하면 이 약물의 개체간 용량 변이를 50% 이상 설명 할 수 있다.

경구혈당강화제인 glipizide도 CYP2C9에 의해 대사되며 이 효소의 대사능저하(poor metabolizer) 환자에서는 상용량에서도 과다하게 낮은 혈당치를 보인다. 다른 경구혈당강화제인 phenformin은 일부 환자에서 유산증을 일으킨다. 이제는 phenformin이 또다른 유전적 다형성을 보이는 효소인 CYP2D6에 의해 대사가 알려졌다. 이 효소의 활성이 유전적으로 낮은 환자는 phenformin에 의한 유산증 발생의 위험성이 특히 더 높을 수 있다.

유전적인 영향에 의해 나타나는 약물의 독성은

Figure 9. Thiopurine methyltransferase (TPMT) 다형성: TPMT 활성의 빈도 분포는 유전형을 반영한다. (L Lennard: Lancet 336:225, 1990)

시토크롬 P450 외의 다른 효소에 의해 대사되는 약물에서도 나타날 수 있다. 항대사약물(antimetabolite)인 azathioprine과 6-mercaptopurine을 투약할 경우 체내에서 생성되어 세포독성을 효과를 나타내는 thioguanine nucleotide는 xanthine oxidase와 thiopurine methyl transferase (TPMT)에 의해 대사되어 불활성화 된다. TPMT의 활성은 삼봉성(trimodal) 분포를 보이며(Figure 9) mercaptopurine으로 백혈병 치료를 받는 어린이들 중 효소 활성이 낮은 환아는 심한 골수억제 부작용을 겪는 반면 활성이 높은 환아는 백혈병 치료효과가 떨어진다. Azathioprine을 류마티스관절염의 치료제로 복용 중인 환자 중 활성이 낮은 돌연변이 유전형을 가진 사람은 치료시작 후 바로 독성을 보이고 따라서 장기간 이 약을 복용하지 못한다. 이와 같이 유전형과 관련된 약물의 독성이 하나씩 알려지고 있다.

수용체 감수성의 증가로 인하여 용량-반응곡선

이 변하는 경우는 동일 혈중농도에서 약물의 효과는 증강된다. 이런 용량-반응곡선의 변화는 수용체의 유전적 다형성으로 초래되는 약물에 대한 민감도 변화 때문일 수 있다는 것이 최근 확인되고 있다. 한 예가 QT가 연장되는 경우로 이는 유전적인 원인으로 심장의 재분극에 관여하는 포타슘 채널에 이상이 있는 사람이 있고 동시에 약리학적인 원인으로 QT 간격을 연장시키는 약물을 복용하는 경우가 있다. 이런 사람의 경우 torsade de pointes가 발생할 수 있다. 많은 약물들이 이런 치명적인 효과를 나타낼 수 있음이 확인되었다.

병용하는 두 약물이 동일한 시토크롬 P450에 결합할 경우 한 가지 약물이 다른 약물의 대사를 억제할 수 있다. 따라서 각 약에 대한 특이적 P450을 확인하는 일은 약물간의 상호작용을 합리적이고 과학적인 근거에서 예측할 수 있게 하는 것이다. 그러한 기전의 예가 erythromycin이나 전신작용항진균제와 같은 CYP3A 억제제에 의해

Table 6. 주요 CYP 효소의 유전형과 인종간 빈도

Gene	Allele	DNA Change	Native Japanese	1st Gen. Japanese	3rd Gen. Japanese	Korea	Chinese	Caucasian
CYP1A2	*1C	G(-3860)A	0.319(160)	0.269(184)	0.292(152)	0.296(186)	0.282(200)	0.010(194)
	*1D	(-2464)delT	0.506(160)	0.430(184)	0.455(152)	0.468(186)	0.535(200)	0.088(194)
	*1E	T(-739)G	0.019(160)	0.032(184)	0.019(152)	0.054(186)	0.104(200)	0.041(194)
	*1K	C(-729)T	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.015(194)
	*1F	C(-163)A	0.700(160)	0.608(184)	0.591(152)	0.661(186)	0.693(200)	0.737(194)
	*2	C63G	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.000(194)
	*1H	A2025C	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.000(194)
	*3	G2385A	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.000(194)
	*4	A2499T	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.000(194)
	*5	G3497A	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.000(194)
	*7	G3534A	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.000(194)
	*6	C5090T	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.010(194)
	*1B	T5347C	0.813(160)	0.823(184)	0.864(152)	0.817(186)	0.847(200)	0.356(284)
	*2	C430T	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.133(284)
CYP2C9	*3	A1075C	0.035(200)	0.048(210)	0.012(164)	0.035(200)	0.025(200)	0.056(284)
CYP2C19	*2	G681A	0.345(200)	0.262(210)	0.331(164)	0.250(200)	0.297(200)	0.136(284)
	*3	G636A	0.090(200)	0.100(210)	0.133(164)	0.080(200)	0.035(200)	0.000(284)
	*4	1AG	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.003(284)
	*5	C1297T	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.000(284)
CYP2D6	*17	C(-806)T	0.005(200)	0.010(210)	0.012(164)	0.015(200)	0.005(200)	0.201(284)
	*2	C2850T	0.155(200)	0.144(210)	0.183(164)	0.175(200)	0.160(200)	0.328(284)
	*2	G4180C	0.590(200)	0.582(210)	0.549(164)	0.675(200)	0.680(200)	0.525(284)
	*3	2549 A>Del	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.021(284)
	*4	G1846A	0.005(200)	0.005(210)	0.000(164)	0.005(200)	0.000(200)	0.182(284)
	*5	Gene deletion	0.070(200)	0.071(210)	0.048(164)	0.075(200)	0.064(200)	0.017(284)
	*6	1707T>Del	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.021(284)
	*7	*7_A/C	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.000(284)
	*8	G1758T	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.000(284)
	*10	C100T	0.435(200)	0.433(210)	0.373(164)	0.505(200)	0.530(200)	0.196(284)
	*14	G1758A	0.005(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.030(200)	0.005(200)	0.000(284)
	*18	4125-4133 insGTGCCCACT	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.000(284)
	*21	2573insC	0.005(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.005(200)	0.000(284)
	*36	Exon 9 2D6/2D7 gene conversion	0.000(200)	0.000(210)	0.012(164)	0.020(200)	0.000(200)	0.000(284)
	X2	Duplication	0.060(200)	0.029(210)	0.049(164)	0.020(200)	0.020(200)	0.042(284)
CYP2E1	*5	G(-1293)C	0.206(160)	0.177(184)	0.208(152)	0.188(186)	0.228(200)	0.041(194)
CYP3A4	*1B	*1B_A/G	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.026(194)
	*2	T15713C	0.000(160)	0.000(184)	0.000(152)	0.000(186)	0.000(200)	0.000(194)
CYP3A5	*1B	*1B_G/A	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.017(284)
	*1C	*1C_C/T	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.017(284)
	*3	*3_A/G	0.780(200)	0.810(210)	0.741(164)	0.755(200)	0.723(200)	0.955(284)
	*6	*6_G/A	0.000(200)	0.000(210)	0.000(164)	0.000(200)	0.000(200)	0.000(284)

terfenadine의 대사가 억제되는 경우이다. 그 결과로 torsade de pointes와 같은 치명적인 심장 부정맥이 초래되었다.

약물유전체의 응용분야

신약의 허가과정의 발전을 역사적인 측면에서 보면 과거에는 안전성을 위주로 신약을 허가를 했고 이후 유효성에 중점을 두었으며 이제는 약물요

법의 개별화(individualization)에 필요한 자료를 요구한다. 따라서 환자의 약물에 대한 exposure-response relationship에 영향을 미치는 intrinsic (eg, age, disease state, genetics) 그리고 extrinsic (eg, drugs, diet, smoking) 요인의 연구가 강조되고 있으며 이런 측면에서 약물유전체 연구나 정보가 중요하다. 특히 표 6과 같이 주요 약물대사 효수들이 인종간의 차이를 보이는 경우가 많아 우리나라와 같이 주로 외국에서 개발된 약물을 사용하

는 경우에는 약물의 허가 관리에 약물유전학 정보의 고려가 필요하다.

약물유전체 검사를 이용하여 약물이용의 정보로 공식적으로 이용하는 데에는 다양한 의문점과 문제점이 해결되어야 한다. 즉 임상시험 참여 전에 유전형에 따른 환자군 분화(ramification)의 문제, subgroup 분석의 통계적 측면, 유전자 검사와 관련된 사항(label에 요구 여부, 사전 허가, 검사의 신뢰성 및 통계적 측면), 사후 subset 분석의 문제, 이미 시판 중인 약물의 약물유전체 검사 요구 여부 등의 다양한 이슈가 남아있으며 이외에도 유전자 진단기구의 개발, 검증 및 이용도 중요한 이슈가 된다. 또한 유전자 검사에 따른 비용의 문제와 유전정보의 보안유지 등 윤리적인 문제 등이 관여된다.

약물의 반응의 개체 차이는 이들 약동학 및 약력학적 관련 유전적 변이들의 복합적인 작용에 의해 결정이 된다. 성공적인 약물유전체 연구의 성과는 의사로 하여금 : (1) 처방전을 쓰기 전에 효과가 있을 환자를 약물요법에 선택하고; (2) 예측된

독성이나 낮은 반응을 근거로 환자를 약물요법에서 제외; (3) 개개인 별로 적당한 용량과 용법을 선택; 그리고 (4) 유전적 검사를 통해 이상반응의 발현 예측을 가능하게 할 것이다. 이미 일부 항암화학요법의 분야(TPMT와 6MP, DPD와 5-FU, Irinotecan 부작용과 UGT1A1 등)에서는 어느 정도 이런 것들이 이용되고 있다.

참 고 문 헌

1. *Harrison's Principles of Internal Medicine, McGraw-Hill Professional; 15th edition, 2001.*
2. Kalow W, Meyer UA, Tyndale RF. *Pharmacogenomics. New York: Marcel Dekker, 2001.*
3. Evans WE, McLeod HL. *Drug therapy: Pharmacogenomics-drug disposition, drug target, and side effects. NEJM 2003;348 (6):538-549.*
4. Weinshilboum R. *Genomic medicine: inheritance and drug response. NEJM 2003; 348 (6):529-537*