다기관 공동 임상시험의 개념 및 연구설계

박 병 주*

Concept and Design of Multicenter Clinical Trials

Byung Joo Park

Department of Preventive Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea

머 리 말

1990년대 이후 정부의 신약개발 의지가 강화되어 보건복지부에서는 신약개발연구비를 확보하여 대학과 제약회사간에 산학협동연구를 추진하도록 적극적으로 지원하고 있어 조만간 국내에서 개발한 신약이 늘어날 것으로 예상되고, 한편으로는 우루과이라운드 협정으로 인하여 외국에서 개발한 신약의 국내 유입이 가속화될 것으로 전망되고 있다. 따라서, 국내에서 개발되었거나, 외국에서 도입된 신약의 효능과 안전성을 적절하게 평가하기 위한 임상시험연구의 필요성이 점차 증대할 것이다. 특히 그 발생이 희귀한 질병이 연구대상이 되는 경우, 연구기간을 단축시키기 위한 목적으로 여러 의료기관이 공동으로 임상시험을 실시하여야 할 필요성이 높아지는데, 아직까지 국내에서는 이와 같은 다기관 공동임상시험연구를 연구설계 단계에서부터 자료의 수집 및 결과분석에 이르기까지 객관적이고 타당한 연구를 수행할 수 있는 능력을 충분히 갖추고 있지 못한 실정이다. 다기관 공동 임상시험의 개념 및 연구설계에 관한 소개를 통하여 향후 국내의 다기관 공동 임상시험연구의 활성화에 기여하고자 한다.

다기관 공동 임상시험의 정의

다기관 공동 임상시험은 문자적인 정의인 '두개 이상의 의료기관이 공통되는 연구계획에 의하여 공동으로 연구를 수행하는 임상시험연구'를 일컫는 것으로 끝나지 않고, 거기에서 연구수행의 전과정을 통제할 수 있는 독립적인 기구인 소위 통제센터(coordinating center)가 존재하여 전 연구과정을 하나의 연구로 묶어주는 공동 임상시험연구로 정의내릴 수 있다. 이 센터에서는 특히 연구대상으로 선정된 환자들을 치료군과 비교대조군으로 무작위배정하는 역할을 수행할 뿐 아니라, 각 연구참여기관으로부터 연구자료를 받아서 그 내용을 검토하여 수정보완하게 하고, 보완된 자료를 전산화하여 결과를 분석하는 기능을 수행함으로써 연구의 객관성과 타당성을 보장하고, 나아가 여러 기관이 공동으로 수행하는 연구를 개별적인 연구의 집합으로 끝내지 않고, 전체가 융합한 하나의 연구로 만들 수 있게 한다. 이러한 통제센터가 없이 단지 공통의 연구계획서를 작성하여 각자가 독자적으로 연구를 수행한 뒤 수집된 연구자료만을 한 곳에서 통합 분석하여 결론을 내리는 것은 다기관공동임상시험(multicenter clinical trial)이라기 보다는 복합적인 단일기관 임상시험(multiple single center trials)으로 밖에 인정할 수 없고, 그 결과는

*서울대학교 의과대학 예방의학교실
교신저자: 박병주

meta-analysis를 시행한 것과 차이가 없게 된다. 물론 실제 다기관 공동 임상시험을 수행하기 위하여는 이외에도 행정관리센터, 중앙검사센터, 판독센터, 질관리센터, 물자 구매 및 배분센터 등 여러 센터가 추가로 필요하게 된다.

다기관 공동임상시험의 계획

다기관 공동 임상시험을 성공적으로 수행하기 위하여는 단일기관에서 수행하는 임상시험에 비하여 여러가지 측면에서 고려하여야 할 점이 많다. 그 중에서도 특히 공동연구를 총괄할 연구책임자를 누구로 할 것이며, 어떤 연구자들로 공동연구진을 구성할 것인지는 공동연구를 계획할 때 가장 먼저 고려하여야 할 사항이며, 또한 이는 실제로 공동연구의 성패를 가름짓는 가장 중요한 관건이 된다. 연구책임자는 연구주제에 관한 최고전문가이어야 함은 물론이거니와 공동연구진을 연구가 종료할 때까지 성공적으로 이끌어 갈 수 있는 실질적인 지도자 역할을 할 수 있는 사람으로 선정하여야 하고, 공동연구자로는 해당 연구에 대한 열의를 가지고 있고 타당한 연구결론을 얻기 위하여 최선을 다할 수 있는 학구적인 사람들을 선정하여야 한다.

다음으로 고려하여야 할 사항은 공동 연구계획서를 작성하는 일인데, 연구계획서에는 연구의 시작부터 종료시까지의 전과정이 구체적으로 기술되어, 연구에 참여하는 사람들이 그대로 따르기만 하면 연구수행에 아무런 지장이 없을 정도로 완벽하여야 하며, 향후 다른 연구팀에 의한 추시가 가능하도록 작성되어야 한다. 연구계획서 내용에 명시되어야 하는 항목에는 연구주제, 연구수행의 배경, 연구대상수, 연구대상 선정기준, 비교대상 치료군의 수, 연구형태, 연구수행조직, 연구기간, 연구대상인구집단, 비교대조군의 설정, 환자의 무작위배정방법, 눈가림법의 적용, 연구의 모니터, 연구자료 데이터베이스의 구축, 자료의 통계분석, 연구의 조기종료기준, 윤리적 측면의 고려 등이 포함되어야 한다. 그 중에서 특히 연구결과 타당성을 보장하기 위하여 필수적으로 중요한 것에는 연구대상자의 객관적인 선정기준, 연구대상자수의 통계적 추정, 환자의 무작위배정방법(random allocation),

비교대조군에 투여할 위약(placebo)의 제조, 눈가림법(blind method)의 적용방법, 치료내용의 표준화, 객관적인 치료결과 평가, 및 연구자료의 분석을 위한 적절한 통계분석법의 적용 등을 들 수 있다. 이러한 내용을 충실히 작성하기 위하여는 연구방법론과 통계분석론에 전문적인 지식을 가진 임상역학자와 통계학자의 도움이 필요할 것이다.

치료효능을 평가하고자 하는 임상시험연구에서는 연구기관간 치료방법의 표준화가 보장되어야 한다. 약물치료의 경우에는 약물의 투여용량, 투여간격, 투여방법 등을 통일함으로써 표준화가 비교적 용이하지만, 수술요법의 경우에는 참여하는 연구자들간에 수술수기의 표준화가 이루어지지 않으면 공동연구를 수행하는 의미가 없어 지므로, 연구계획서에 수술방법을 구체적으로 기술해야 함은 물론, 공동연구자간에 충분한 기간동안 사례발표와 토의등을 통한 표준화 작업을 가져야 한다. 또한 연구대상이 되는 치료내용외에 환자에게 제공되는 보조적인 치료내용도 모든 의료기관에서 동일하도록 표준화하여야 한다.

전체 연구계획이 작성되면 그 연구의 윤리성을 검토받기 위하여 각 기관별 임상시험 심사위원회(IRB; Institutional Review Board)에 연구계획서를 제출하여 심사를 받는다. 연구기관별 임상시험 심사위원회에서는 연구계획서를 검토하여 연구수행중에 연구대상자들의 인권을 침해하거나 부당한 피해를 입힐 가능성을 검토하고, 환자로부터 연구참여의 동의를 구하는 방법이 윤리적인지를 평가한다.

공동연구를 성공적으로 완수하기 위하여는 참여한 연구자들이 연구종료시까지 높은 연구의욕을 유지할 수 있어야 하는데, 연구계획서에 공동연구에 참여하는 연구원들의 의무와 책임한계를 명확히 해두는 것도 중요하지만, 연구의 기본주제뿐 아니라 가능한 최대한 부수적인 연구주제를 확보하여 연구수행후 다수의 논문을 만들어 참여한 연구자들에게 연구결과를 공평하게 배분할 수 있도록 계획하여야 한다.

연구계획이 완성되면 실제 연구를 수행하는 과정에 연구기관과 통제센터간, 연구기관들 및 연구에 참여하는 각종 센터간에 원활한 정보교환을 할 수 있도록 효과적인 정보통신망을 구축하여야 한다. 즉, 각 연구기관에서 연구대상이 선정되면 통제센터에 관련된

보를 보내어 그 연구대상자에게 배정할 치료법을 무작위배정받아 치료를 시행하고, 기초조사 및 추적조사시 연구대상으로부터 얻은 자료를 보내어 검토를 받은 후 필요하면 수정보완한 다음, 데이터베이스를 구축해 나가는 과정이 원활하게 추진되어야 효과적으로 연구를 수행할 수 있게 되며, 또한 연구수행도중에 연구대상자로부터 예기치 않았던 문제가 발생하는 경우에도 즉각적인 조치가 가능해 진다. 정보통신망은 전화나 FAX등을 이용할 수 있는데, 최근에는 연구기관간에 전산망을 이용하므로써 정보교환이 보다 신속하고 편리해지고 있다.

서로 다른 의료시설과 운영체계를 가지고 있는 다수의 연구기관이 공동으로 수행하는 연구의 질적 수준을 높게 유지하고, 능률적으로 연구를 수행하기 위하여는 기능적인 연구수행조직을 가져야 한다. 이를 위하여는 운영위원회, 외부자문위원회, 실무추진위원회, 자료분석위원회, 질관리위원회, 검사위원회, 약물 및 독성위원회, 부수적 연구위원회, 출판위원회 등의 위원회를 구성하여 유기적인 관련성을 갖도록 운용하여야 한다. 특히, 임상역학을 전공한 자로서 임상시험과정을 모니터하고 연구자료의 질관리를 전달할 전문가가 필요한데, 그 역할은 연구에 참여한 기관들간에 연구수행과정의 표준화가 지켜지고 있는지를, 각 과정별로 연구시작전에 작성된 기준과 비교검토하여 감독하는 것이다. 예를 들면, 환자선정기준이 엄격히 지켜지고 있는지, 검사과정에 대한 질관리가 제대로 되고 있는지, 환자에 대한 진단기준이 일정하게 지켜지는지, 치료방법과 치료결과의 평가가 연구계획서에 있는대로 잘 지켜지고 있는지 등을 연구진으로부터 독립적인 입장에서, 연구기관의 이름을 알지 못하는 상태에서(blind) 수행하여 문제점이 발견되면 수정하도록 하여 연구의 질적 수준을 높게 유지할 수 있도록 한다. 새로 개발된 치료제의 효과와 안전성을 평가하기 위하여 다기관공동 임상시험연구를 수행할 가상적인 조직체계를 도식화하면 Fig. 1과 같다.

연구를 수행하는 도중에 각종 위원회는 정기적인 모임을 갖도록 하고, 특별한 사유가 발생하면 임시모임을 가질 수 있다. 운영위원회와 자료분석위원회는 정기적인 모임을 가지는 것이 좋은데, 그 주기는 보통

전체 연구수행기간을 3~4등분한 간격으로 하고 있다. 그 모임에서 운영위원회는 연구수행의 중간 진행사항을 점검하여 그동안 발생된 문제가 있으면 해결하고, 자료분석위원회로부터 연구자료의 중간분석결과를 보고받아, 임상시험연구를 계속해 나갈지, 조기에 중단시킬지의 여부를 결정한다.

다기관 공동 임상시험에서의 연구대상자확보 및 무작위배정 방법

1. 연구대상자 확보

임상시험연구를 계획하는 단계에서 임상시험의 대상으로 선정될 연구대상자의 확보율은 연구에 참여할 의료기관에서 평소에 진료받고 있는 환자의 수를 근거로 하여 추정하게 되는데, 대부분의 임상시험연구에서 연구대상 확보율을 과대평가하게 되어, 실제로 연구를 시작한 후에는 연구대상 확보율이 현저히 떨어지는 현상이 발생한다. 이를 Lasagna의 법칙이라고도 하는데, 이는 주로 해당 질환자 가운데 연구대상을 선정하기 위한 선정기준을 엄격하게 적용하기 때문인 것으로 알려져 있다. 연구대상의 확보율이 저조하면 미리 정해진 연구기간내에 연구를 종료할 수 없게 되므로 임상시험연구를 계획할 때 이러한 점을 감안하여 연구대상의 확보를 극대화하도록 노력하여야 한다.

다기관공동 임상시험은 여러 지역의 연구기관이 공동으로 참여하기 때문에, 연구대상자의 확보를 위하여 각 지역의 메스컴을 통하여 일반인들 또는 환자들에게 연구의 목적과 필요성 및 기대효과를 홍보하여 참여동기를 부여하여야 하는데, 효과적인 동기유발을 위하여는 환자들이 연구에 적극적으로 참여하도록 만드는 요인이 무엇인지를 파악하는 게 중요하다. 공동연구에 직접 참여하지 않는 의사들에게 협조를 요청하여 연구대상이 될만한 환자에게 연구참여를 권유해 줄 것을 부탁하고, 또한 환자를 연구대상이 되도록 도와준 의사에게는 임상시험연구의 결과를 직접 알려주는 등 적절한 반대급부를 해주어야 한다.

만약 연구수행중에 연구대상 확보율이 지나치게 낮아 연구수행에 심각한 차질이 생기게 되면 연구대

－ 박병주 : 다기관 공동 임상시험의 개념 및 연구설계 －

Fig. 1. Organization for multicenter clinical trials.

상의 선정기준이 지나치게 엄격한 것이 아닌지를 검토하여 가능한 범위내에서 완화하는 방안을 마련할 수 있고, 또한 공동연구에 참여하는 연구기관의 수를 늘리는 방법도 강구하여야 할 것이다.

임상시험연구시 연구대상의 인권을 존중하기 위한 윤리적인 측면에서 환자로부터 연구참여 여부에 관한 동의를 얻도록 하고 있는데, 구두로 동의를 받느냐 서면으로 동의를 받느냐에 따라 연구대상 확보율에 큰 영향을 미친다. 특히 우리나라와 같이 연구대상자가 되기를 꺼려하는 풍토가 만연하는 곳에서는 엄격한 서면동의만을 받도록 하면, 연구대상의 확보가

매우 어렵게 된다. 따라서 연구내용에 따라 서면동의를 원칙으로 하면서 불가피한 경우에는 구두동의를 얻을 수 있도록 예외를 인정하는 것이 임상시험연구의 활성화에 기여할 것이다.

2. 무작위배정을 시행하여야 하는 이유

임상시험연구에서 비교하고자 하는 치료군들에 연구대상자를 무작위로 배정하여야 하는 이유는 크게 세가지를 들 수 있다. 첫째는 연구결과와 내적 타당도를 극대화하기 위하여 비교하고자 하는 치료군들에 속한 연구대상자들의 특성이 연구대상 치료법외에는

최대한 유사하도록 만들어 주어야 한다는 조건을 만족시키기 위함이다. 특히 임상시험연구는 사람을 직접 연구대상으로 하는 실험적 연구이기 때문에 윤리적인 측면에서 연구자가 연구대상자에게 통제할 수 있는 실험조건은 극히 제한될 수 밖에 없다. 따라서, 무작위배정에 의한 환자배정을 하지 않으면 비교하고자 하는 치료군들에 배정된 환자들의 특성차이 때문에 연구결과가 심각한 영향을 받을 경우 연구결과의 타당성을 인정받지 못하게 된다. 극단적인 경우에 신약의 치료효과를 드러내고 싶은 욕심에서 의식적으로 예후가 좋을 환자들을 신약치료군에 배정하고 예후가 불량할 환자를 대조군에 배정하게 되면, 결과적으로 그 신약의 치료효과는 실제 이상으로 과대평가될 것이다. 연구대상들의 측정가능한 특성들 뿐 아니라, 측정할 수 없는 특성들까지도 유사하게 만들어 주기 위하여는 무작위배정법이 가장 우수한 방법으로 인정되고 있다. 예를 들어, 신약치료군과 위약치료군 두 군간의 치료효과를 비교하고자 할 때, 신약치료군에 속한 연구대상자들이 치료에 대한 순응도(compliance)가 매우 낮은 사람들로 배정되었다면, 비록 신약의 치료효과가 현저하더라도 연구결과는 위약과 차이가 없게 나타날 수 있는 것이다.

둘째는 윤리적인 측면에서 연구대상으로 참여할 모든 사람(환자)들에게 동등한 대우를 하기 위함이다. 새로 개발한 약물의 효과를 평가하고자 하는 경우에는 그 약의 효능과 안전성에 대한 정보가 충분하지 않기 때문에 그 약을 투여받게 되는 연구대상이 혜택을 받게 될지 부작용으로 인한 피해를 입게 될지 모르는 상황이다. 만약 연구자가 신약의 치료효과가 기존의 표준치료제보다 우수하다는 믿음이 있을 때, 연구자에게 치료법의 배정을 맡기면 인지상정에 의하여 아는 환자를 신약치료군에 배정하려 할 것이므로, 상대적으로 연구자가 잘 알지 못하는 사람에게 피해를 줄 수 있는 확률이 높아진다. 또한 신약에 의한 부작용이 우려되는 경우에도 이러한 현상이 발생할 수 있다. 셋째, 통계적 분석은 확률론에 근거하여 개발되었는데, 비교하고자 하는 치료군에 대한 연구대상자의 배정을 무작위확률(random probability)에 의하여 결정하는 무작위 배정법은 연구자료의 분석에 통계적 기법을 적용하기 위한 전제조건을 만족시키게 된다.

3. 무작위 배정방법

비교하고자 하는 치료군에 환자를 무작위로 배정하는 방법에는 가장 간단한 방법으로 단순무작위배정법(simple randomization)이 있는데, 이는 연구대상자를 두 치료군에 배정하고자 할 때 동전의 앞뒷면이나 주사위의 작홀수에 의하여 배정하는 방법이다. 좀더 발전한 방법으로 난수표(random number table)를 이용하거나, 컴퓨터를 이용하여 난수를 만들어 이용하는 방법이 있는데, 난수표는 대부분의 통계책에 부록으로 제시되어 있고, 연구대상자의 수가 그리 많지 않을 때는 사용하기가 쉽다. 그러나, 연구대상자의 수가 많은 경우에 단순무작위배정법을 적용해 나가면 점차 두 군에 배정되는 환자수의 균형이 깨어지는 현상이 발생한다. 이 때문에 도중에 새로운 무작위배정표를 만들어 대체하는 방법(replaced randomization)이나, 비교하고자 하는 군들에 배정된 환자수의 차이에 따라 새로 연구대상자로 선정된 연구대상자가 각 치료군에 배정될 확률을 다르게 하여 배정하는 방법(biased coin method)을 쓰기도 한다.

실제 임상시험연구에서 흔히 사용하고 있는 방법에는 블럭화 무작위배정법(blocked randomization)이 있다. 이 방법은 비교대상군에 배정되는 연구대상자수의 불균형을 최소화하기 위하여 연구대상자의 수를 4명, 6명, 8명 등의 일정한 블럭으로 만들어 각 블럭내에서는 비교대상 치료법에 배정되는 연구대상자의 수가 동일하도록 배정해 주는 방법이다. 블럭화 무작위배정법에는 전체환자를 대상으로 치료군을 블럭화하는 비계층화 블럭 무작위배정법(unstratified blocked randomization)과, 환자의 예후에 유의한 영향을 미치는 것으로 밝혀진 예후변수에 따라 층화한 뒤 각 계층내에서 블럭화 무작위배정하는 계층화 블럭 무작위 배정법(stratified blocked randomization)으로 나눌 수 있다. 다른 방법으로 적응성 층화 배정법(adaptive stratified randomization)을 들 수 있는데, 이 방법에는 연구대상을 선정할 때 파악한 특성을 근거로 하여 이미 밝혀진 예후변수들의 분포를 비교군들간에 유사하게 만들면서 무작위배정을 해 나가는, 기준시점의 특성에 의한 적응성 무작위배정법(baseline adaptive randomization)에 해당하는 최소화법(minimization technique)과, 환자에게 배정된 치료법의 결

과에 따라 그 다음 환자에게 배정될 치료법이 정해지는, 반응별 적응성 무작위배정법(response adaptive randomization)인 승자승 방법(play the winner model)이 있으며, 그외에도 여러 무작위배정방법들이 소개되어 있으나, 본 고에서는 블럭화 무작위배정법과

층화 블럭 무작위배정법에 국한하여 예를 들면서 무작위과정을 좀더 상세히 기술하고자 한다.

먼저 24명의 연구대상자를 두개의 치료군에 4명 단위의 블럭으로 비계층화 무작위배정하는 과정이 Table 1에 제시되어 있다. 두 치료법의 이름을 각각

Table 1. Block randomization

Group 24 patients into 6 blocks of 4 patients each.											
The first four patients form a block, the next four form another block, etc.											
Different patterns of arranging 2 treatments in groups of 4											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
	A	B	B	A	B	A	A	B	B	A	A
	B	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B
	B	A	B	A	A	A	A	A	A	B	B
Random sequence of integers : 2, 6, 4, 3, 1, 5											
Patient No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Treatment	B	B	A	A	B	A	A	B	B	A	B
Pattern	2				6				4		
Patient No.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Treatment	A	B	A	B	A	A	B	B	A	B	B
Pattern	3				1				5		

Table 2. Stratified block randomization schedule for three institutions(each institution has a separate randomization schedule)

Physical status	Ambulatory			Non-ambulatory		
Institution	α	β	γ	α	β	γ
randomization schedules	$\overline{A}$	B	A	B	A	$\overline{B}$
(fixed in advance)	A	B	B	A	B	A
	B	A	A	B	B	A
	B	A	B	A	A	B
Chronological order of entry	Institution		Physical status*		Treatment	
1	α		a		$\overline{A}$	
2	γ		na		$\overline{B}$	
3	α		a		A	
4	γ		na		A	
5	β		na		A	
6	β		a		B	
7	γ		a		A	
8	α		a		A	
9	γ		na		A	
10	α		na		B	
11	β		a		B	
12	β		a		A	

* a : ambulatory, na : non-ambulatory

A, B라고 하면, 각 블록내에서 두 치료법에 배정되는 환자수는 각각 2명씩이 되어야 하고, 가능한 배정순서의 경우는 AABB, BBAA, ABAB, BABA, ABBA, BAAB 등의 6가지가 된다. 블록의 순서대로 1번부터 6번까지의 번호를 매긴다음, 24명의 환자를 치료군에 배정하기 위하여 무작위로 6개 블록의 순서를 정하면 된다. 본 예의 경우에는 그 순서가 2번 블록, 6번 블록, 4번 블록, 3번 블록, 1번 블록 및 5번 블록의 순서로 결정되었다.

세계의 의료기관이 공동으로 임상시험을 수행하고자 계획하면서, 신체상태(physical status)를 예후변수로 하여 계층화 블록 무작위배정법을 적용하고자 하는 경우, 공동연구에 참여하는 각 의료기관에서 독자적으로 예후변수에 대한 계층화 블록 무작위배정법에 의하여 환자를 배정하는 경우(Table 2 및 Table 3)와 의료기관간의 환자수 균형보다는 예후변수에 대한 환자수균형을 보다 중시하여 환자를 블록 무작위배정하는 경우(Table 4 및 Table 5)를 비교하므로써, 다기관 공동임상시험을 수행할 때 독립적인 통제센터(coordinating center)의 역할이 얼마나 중요한지를 보여 주고자 한다. 각각의 의료기관이 개별

적으로 예후변수에 대하여 계층화한 뒤, 각 계층별로 4명씩의 블록으로 환자를 배정하는 무작위배정표를 만들어 연구대상자가 선정될 때마다 치료법을 배정해 나가는 과정이 Table 2에 제시되어 있다. 즉, 첫번째로 연구대상이 된 환자는 의료기관 α 의 환자로서 보행이 가능하므로 미리 작성되어 있는 무작위배정표에서 Ambulatory이면서 의료기관 α 에서 첫번째로 선정되

Table 3. Summary of number of patients assigned by physical status and institution

Factor	Number assigned	
	to A	to B
Physical status		
Ambulatory	5	2
Non-ambulatory	3	2
	—	—
	8	4
Institution		
α	3	1
β	2	2
γ	3	1
	—	—
	8	4

Table 4. Stratified block randomization schedule which balanced out exactly over strata, but only approximately within institutions

Ambulatory schedule		A A B B A B A B B A A B B			
Non-ambulatory schedule		B B A A B A B A A B B A A			
Chronological order of entry	Institution	Physical* status	Tentative assignment	D +	Final assignment
1	α	a	A	1	A
2	γ	na	B	1	B
3	α	a	A	2	A
4	γ	na	B	2	B
5	β	na	A	1	A
6	β	a	B	0	B
7	γ	a	B	3	A
8	α	a	B	1	B
9	γ	na	A	0	A
10	α	na	B	0	B
11	β	a	B	1	B
12	β	a	A	0	A

*a: ambulatory, na: non-ambulatory

+ If $|D| < 3$ in an institute, then use the tentative treatment as the final assignment; if $|D| = 3$ in an institute, then use an alternate treatment as the final assignment.

Table 5. Summary of number of patients assigned by physical status and institution

Factor	Number assigned to A	Number assigned to B
Physical status		
Ambulatory	4	3
Non-ambulatory	2	3
	—	—
	6	6
Institution		
α	2	2
β	2	2
γ	2	2
	—	—
	6	6

어 있는 치료법 A를 배정하게 된다. 다음 환자는 의료기관 γ의 환자로서 보행이 가능하지 않으므로 치료법 B를 배정하게 되며, 나머지 연구대상자들도 선정되는 순서대로 같은 방법을 적용해 나간다.

이러한 방법으로 환자를 배정해 나가다가 전체 연구대상의 반인 12명까지 배정한 결과를 신체상태별, 의료기관별로 요약해 보면, Table 3에서 보는 바와 같이 예후변수인 신체상태의 계층간뿐 아니라 의료기관간에도 불균형이 생겨있음을 보게 된다. 이와 같이 여러 의료기관이 단지 연구계획서만을 공동으로 작성한 뒤 각 기관별로 연구를 수행하는 복합적인 단일기관 임상시험연구(multiple single center trials)에서는 연구가 진행되면서 연구기관간 및 예후변수의 계층간 불균형이 더욱 심화될 수 있어 연구가 종료되어 연구자료를 통계적으로 분석할 때 큰 곤란을 겪을 수 있다.

이와 같은 불균형의 초래를 예방하고 예후변수의 계층간 연구대상수의 균형을 유지하는 방법이 Table 4에 제시되어 있다. 먼저 공동임상시험의 통제센터에서는 의료기관간의 환자수 균형은 고려하지 않고, 예후변수(신체상태)의 계층간에는 환자수에 엄격한 균형을 이루도록 무작위배정표를 만든다. 모든 의료기관에서 연구대상자가 선정되는 순서대로 환자의 신체상태별로 무작위 배정표에 따라 치료법을 배정해 나간다. 예를 들면, 첫번째 환자는 보행이 가능하므로 무작위배정표대로 치료법 A를 배정하고, 두번째 환

자는 보행이 불가능하므로 치료법 B를 배정하며, 세번째 환자는 보행이 가능하므로 치료법 A를 배정하는 등의 방법으로 치료법을 배정해 나간다. 새로운 연구대상자에게 치료법을 배정할 때마다 잠정적으로 정해진 치료법을 배정한 결과로 각 의료기관에서 발생하는 환자수의 불균형이 어느 정도인지를 파악한다. 만약 새로운 연구대상에게 배정되는 치료법으로 인하여 두 치료군에 배정되는 환자수의 차이가 3명 미만이면 잠정적으로 정해진 치료법을 그대로 배정하고, 3명이 되면 잠정적으로 배정된 치료법이 아닌 다른 치료법을 배정한다. 예를 들어, 일곱번째로 연구대상으로 선정된 환자의 경우는 보행이 가능하므로 미리 작성되어 있는 무작위배정표의 ambulatory schedule에서 네번째에 해당하는 치료법 B를 배정하면, 그 환자가 속해 있는 의료기관 γ에서는 이미 두명의 환자가 치료법 B에 배정되어 있고, 치료법 A에 배정된 환자는 한명도 없으므로, 다시 치료법 B를 배정함으로써 두가지 치료법에 배정되는 환자수의 차이가 3명이 된다. 따라서 이 경우에는 잠정적으로 배정된 치료법 B 대신에 치료법 A를 배정하여 그 차이를 줄이도록 한다.

이러한 방법으로 12명의 연구대상자를 두가지 치료군에 무작위로 배정하여 그 결과를 종합하니 Table 5에 제시한 바와 같이, 연구대상자 수의 균형이 의료기관간에 잘 지켜질 뿐아니라, 예후변수의 계층간에도 환자수의 균형상태가 보다 나아진 것을 알 수 있다. 따라서, 공동연구에 참여하는 의료기관에서 독자적으로 무작위 배정법을 적용하는 것보다 통제센터에서 무작위 배정을 시행하는 것이 훨씬 좋은 결과를 얻게 된다.

다기관 공동 임상시험의 장단점

다기관 공동임상시험의 단점은 연구설계가 복잡할 뿐아니라 연구수행을 위한 효과적인 조직을 구성하기 힘들고, 연구대상으로 선정된 환자를 연구대상 치료군에 무작위로 배정하는 과정이 어렵고, 연구수행 과정의 질적 수준을 높게 유지하기 위한 모니터링을 지속적으로 수행하기가 쉽지 않고, 단일기관임상시험에 비하여 대부분의 경우 연구비가 훨씬 많이 들

기때문에 연구를 성공적으로 완료하기가 매우 힘들다. 공동의 연구계획서를 작성하여 연구에 참여한 의료기관별로 임상시험 심사위원회(IRB)의 심사를 받는 경우에 일부 의료기관에서는 승인을 받지 못하는 경우도 생기게 된다. 또한 다수의 연구자가 참여하여 장기간에 걸친 임상시험을 수행하는 경우 참여한 연구원들의 연구의욕을 처음과 같이 높은 수준으로 유지하기는 매우 어렵다. 특히 연구결과로 얻게 되는 연구논문이 단 한 편뿐이라면 대다수의 연구참여자는 자신의 노력에 대한 적절한 보답을 받지 못하는 것으로 느끼게 되어 연구에 적극적으로 참여할 의욕을 가지지 못한다. 더구나 공동연구에 참여하는 의료기관 및 연구자간에 수준차이가 크면 공동으로 연구를 수행하는 의미가 없으므로, 그러한 경우는 무리하게 공동연구를 추진할 것이 아니라 소수의 비슷한 수준을 가진 의료기관으로 국한하여 연구를 수행하여야 할 것이다. 이는 특히 연구대상수가 작을 경우에 중요한 의미를 가지는데, 공동연구의 결과를 분석할 때 의료기관을 층화변수로 하여 의료기관간의 수준차이에 의한 영향을 분석하여야 하는데, 연구대상수가 작으면 이러한 통계분석이 어렵기 때문이다. 임상시험연구에서는 연구결과의 일반화보다는 연구결과의 내적 타당도가 더욱 중요하기 때문에 소수의 환자를 많은 의료기관에서 선정하기 보다는 소수의 의료기관에서 많은 수의 연구대상을 확보하는 것이 보다 바람직한 연구형태가 된다.

다기관 공동임상시험의 장점은 여러 기관에서 공동으로 연구대상을 선정하기 때문에 환자확보율이 단일기관 임상시험에 비하여 높기 때문에 희귀한 질병에 대한 치료법의 평가를 위한 임상시험이 가능해지며, 임상시험의 연구기간을 단축할 수 있고, 연구대상의 대표성이 높아지고 실제 의료현실을 최대한 반영하기 때문에 연구결과의 일반화가 보다 용이해진다는 점을 들 수 있다. 또한 다수의 연구자가 공동으로 연구 계획서를 작성하고 연구를 수행하기 때문에 개인연구자에 의한 편견이 작용할 가능성이 적어진다. 그리고, 독립적인 통계센터에 의하여 연구대상자가 치료군에 무작위배정되고, 연구자료가 완전하게 구축, 관리될 뿐 아니라 질관리위원회의 모니터로 연구수행의 질적 수준을 높게 유지하므로써 수준높은

연구의 수행이 가능해진다. 일단 공동 연구진이 구성되어 연구가 활성화되면, 임상시험에 참여하였던 연구자들의 임상시험 수행능력이 향상되어 다른 임상시험을 추가하거나 동시에 수행하기가 쉬워진다. 잘 계획된 다기관 공동임상시험을 성공적으로 수행하게 되면 그 결과는 국제적으로 인정받을 수 있게 되고, 나아가 국내 개발 신약 및 외국에서 수입된 신약의 유효성과 안전성에 대한 평가작업이 용이해져 의료수준의 향상을 기약할 수 있음은 물론이거니와 국민들을 약화사고로부터 효과적으로 보호할 수 있게 될 것이다.

맺 는 말

우리나라에서도 앞으로 다기관 공동임상시험연구가 활성화되어야 하겠다. 이를 위하여는 무엇보다도 먼저 국민들에 대한 효과적인 홍보와 계몽을 통하여 임상시험연구의 필요성과 중요성을 인식시키기 위한 노력이 범의료계 차원에서 경주되어야 할 것이다. 현재와 같이 일반 국민들의 의료인에 대한 불신이 만연해 있는 상황에서는 임상시험의 연구대상을 확보하기가 쉽지 않을 것임은 자명하다. 의료인들에 대한 인식을 바꾸기에는 많은 노력과 오랜 시간을 필요로 할 것이다. 우선 의료인들이 가까운 가족이나 친척, 친지들부터 계몽해 나가야 할 것이다.

현재 정부에서는 임상시험연구의 적정화와 피험자의 권익과 안전을 보호하기 위하여 '의약품 임상시험 관리기준(KGCP; Korea Good Clinical Practice)'을 제정하여 입법예고중에 있다. 이 관리기준이 시행되면 임상시험연구의 윤리적인 측면이 강화될 뿐 아니라 연구결과의 타당도도 매우 높아 질 것으로 예상되지만, 이러한 제도의 성과를 극대화하기 위하여는 의료인들이 의료수준의 향상과 약화사고를 예방하고자 하는 동기에서 제대로 된 임상시험을 시행하겠다는 적극적인 연구의지를 가지고 연구에 임하여야 할 뿐 아니라, 연구원들간에 연구결과를 공유하겠다는 협동정신이 있어야 할 것이며, 이러한 바탕에서 정부는 연구자들을 지원하고 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련하고, 국립임상시험센터를 설립하며 연구비를 제공하는 등의 노력으로 임상시험연구의 활성화를

촉진하여야 할 것이다. 예를 들면, 임상시험 도중에 예기치 않았던 부작용의 발생으로 피해를 입은 연구 대상자들을 보상하기 위한 임상시험보험제도의 도입으로 연구대상자나 연구자가 선의의 피해를 입지 않도록 해주어야 한다. 또한 다기관 동등임상시험의 수행에 필수적으로 요구되는 통제센터를 각종 임상 의학회, 정부, 기업측에서는 독자적으로 또는 공동으로 설치하여 다기관 공동임상시험연구를 지원할 수 있도록 하여야 할 것이다. 이를 위하여 재정적인 지원도 중요하지만 무엇보다도 임상역학자와 통계학자 등 관계 전문가를 육성하도록 노력하여야 한다. 끝으로 정부에서는 사전에 충실히 계획되고 연구수행상의 질관리가 잘되어 연구결과의 타당도를 높이 인정할 수 있는 다기관 공동임상시험연구의 결과는 단일기관에서 수행한 임상시험 결과보다 높이 평가할 수 있도록 제도적 장치나 정책적 배려를 마련하여야 한다. 그러나, 연구설계나 연구수행상의 질관리가 제대로 되지 않으면서 참여 연구기관의 수만 늘리는 경우는 오히려 그 연구결과의 타당도는 단일기관 임상시험의 연구결과보다 낮기 마련이므로 이러한 형태의 연구는 지양하는 방향으로 나가야 할 것이다.

References

- 1) 안윤옥. 임상시험의 설계. 한국역학회지 1989 ; 11 : 1-17
- 2) 박병주. 임상역학의 연구영역. 한국역학회지 1994 ; 16(1) : 6-19
- 3) 이의경 · 장선미 · 박병주 · 박형섭. 의약품 임상시험 관리기준 도입방안 연구. 서울 ; 한국보건사회연구원, 서울, 1994
- 4) Meinert CL. *Clinical trials : design, conduct and analysis*. Oxford University Press, New York, 1986
- 5) Spliker B. *Guide to clinical trials*. Raven Press, New York, 1991
- 6) Buyes ME, Staquet MJ and Sylvester RJ. *Cancer clinical trial : Methods and practice*, Oxford University Press, Oxford, 1988
- 7) Feinstein AR. *Clinical epidemiology : The architecture of clinical research*. WB Saunders Company, Philadelphia, 1985
- 8) Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. *Clinical epidemiology : The essentials*, 2nd ed. Williams & Wilkins, Baltimore, 1988
- 9) Friedman LM, Furberg CD, DeMets DL. *Fundamentals of clinical trials*, 2nd ed. PSG Publishing Company, Inc, Littleton, 1985
- 10) Gehan EA. The determination of the number of patients required in a preliminary and follow-up trial of a new chemotherapeutic agent. *J Chron Dis* 1961 ; 13 : 346-53
- 11) Piantadosi S. *Principles of clinical trial design*. *Seminars in oncology* 1988 ; 15 : 423-33
- 12) Pocock SJ. *Clinical trials : A practical approach*. John Wiley & Sons, Chichester, 1983
- 13) Weiss NS. *Clinical epidemiology : The study of the outcome of illness*. Oxford University Press, Oxford, 1986
- 14) Zelen M. The randomization and stratification of patients to clinical trials. *J Chron Dis* 1974 ; 27 : 365-75