약물역학의 발전배경 및 연구방법론

박 병 주

History and Methodology of Pharmacoepidemiology

Byung-Joo Park

Department of Preventive Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea

1. 약물역학의 정의

약물역학은 영어로 pharmacoepidemiology, drug epidemiology, postmarketing surveillance(PMS), phase IV clinical trial 등의 여러가지 용어로 쓰이고 있다. 역학의 정의가 인구집단에서 질병의 발생빈도를 파악하고, 질병의 발생과 관련되는 요인을 파악하여 예방대책을 수립하는 학문이라고 한다면, 약물역학은 인구집단에서 약물의 사용으로 인하여 발생하는 이롭거나 해로운 결과를 그 빈도를 파악하고 특정 약물복용과의 관련성을 분석하는데 역학적인 지식과 연구방법론을 이용하는 학문으로 정의할 수 있다. 즉, 약물역학(藥物疫學)은 역학(epidemiology, 疫學)과 임상약리학(clinical pharmacology, 臨床藥理學)이 접목된 학문분야라고 할 수 있다.

2. 약물역학의 발전배경

질병을 치료하는 수단으로서 약물을 사용하기 시작한 역사는 오래 되었지만, 약물의 안전성과 유효성을 과학적으로 판정하여 그 결과에 따라 약물의 사용여부를 결정하고 실제 질병의 효과적인 치료수단으로서 약물요법이 정착하게 된 것은 그 역사가 길지 않다. 20세기가 되기 전까지는 미국에서도 각종 조잡한 약물들이 아무런 검정과정을 거치지 않고 소위 만병통치약이란 이름으로 공공연히 선전되고 있다가, 1906년 Pure Food and Drug

Act가 통과된 후에야 비로소 연방정부에서 약물에 관한 통제권을 행사할 수 있게 되었다. 1937년 sulfanilamide에 의한 신부전증으로 100명이상이 사망하는 약화사건이 발생하여 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act가 제정되므로써 약물의 시판을 허가 받기 위하여는 새로 개발된 약물에 대한 전임상 독성검사를 철저히 하도록 강화되었고, 제약회사는 FDA에 그 약물의 안전성에 관한 자료를 의무적으로 보고하게 되었다. 1950년대에는 chloramphenicol에 의하여 재생불량성 빈혈환자가 다수 발생하므로써 약물의 안전성에 관한 일반의 관심이 더욱 고조되었고, 특히 1961년 유럽에서 thalidomide에 의한 대규모 약화사건이 발생한 이후 1962년에 Kefauver-Harris Amendment를 통과시켜, 새로 개발된 약물이 FDA의 승인을 받기 위하여는 반드시 그 약물의 안전성과 유효성을 확인하기 위한 IND과정과 NDA과정을 거치도록 제도를 강화하게 되었다. 유럽 각국에서도 약물에 의한 건강장애에 관한 경각심을 높히게 되었다. 세계보건기구에서는 1968년부터 세계 각국으로부터 약물의 안전성에 관한 정보를 수집하여 전파하고 있다. 1970년대이후 보스턴대학의 약물역학부서에서는 병원환자를 대상으로 시행한 환자-대조군 연구의 결과로 약물로 인한 시판전 임상시험에서는 발견되지 않았던 예기치 못한 증증의 부작용을 밝혀내게 되었고, 이러한 약물역학적 연구는 미국전역에서 활발히 수행되게 되었다(표 1). 1980년대에 이르러 영국에

서울대학교 의과대학 예방의학교실

표 1. 미국에서 약물역학의 발전배경

1906	US Pure Food and Drug Act passed
1937	Sulfanilamide induced renal failure and more than 100 deaths
1938	US Federal Food, Drug, and Cosmetic Act passed
1951	Humphrey-Durham Amendment ; OTC vs prescription drugs
1950s	Chloramphenicol-induced aplastic anemia
1954	Registry of drug-induced blood dyscrasias by AMA
1960	Adverse-drug-reaction reporting system by FDA
1961	Thalidomide-induced phocomelia in Europe
1962	Kefauver-Harris Amendment ; extensive toxicologic testing
1967	FDA monitoring adverse drug reactions and program for creation of extramural pharmacopeidemiologic databases
1970s	Hospital-based case-control studies by Drug Epidemiology Unit
1977	Computerized Online Medicaid Pharmaceutical Analysis and Surveillance System
1986	Revision of FDA New Drug Application Regulations
1990	FDA Parallel Track policy proposed

서도 약물의 안전성을 모니터하는 체계를 갖추게 되었고, 유럽 각국에서는 국가간 컴퓨터 네트워크를 구축하여 공동으로 약물역학적 연구를 활발히 수행하고 있다.

3. 약물역학적 연구를 수행하는 이유

미국의 경우 제약회사에서 새로운 약물을 개발하여 그 약물의 시판을 허가받으려는 경우에 그 약물을 환자에게 사용할 때의 안전성과 유효성을 입증할 수 있는 자료를 제출하도록 요구하기 때문에, 전임상연구로부터 직접 사람을 대상으로 하는 제 1, 2, 3상의 임상시험을 거치게 된다. 그러나, 시판을 허가받기 위한 제 3상 임상시험까지는 가능한 빨리 승인을 받기 위한 목적때문에 관찰기간이 제한되게 되고, 연구대상자의 수가 한정되며, 엄격한 연구대상자의 선정기준을 적용하므로써 연구 결과의 타당도는 높지만 그 결과를 모든 환자에게

일반화시키기 어려운 문제가 있다. 연구설계가 실험적 연구이기 때문에 치료효과가 있다고 관찰된 경우 그 결과를 인정할 수 있는 가장 강력한 증거를 제시하게 되는 강점이 있지만, 연구의 수행이 어렵고 연구비가 많이 드는 것이 단점이다. 일단 약물이 시판허가를 받고 판매를 시작하면 남녀노소의 구분없이 많은 수의 사람들이 장기간에 걸쳐 복용할 수 있기 때문에 시판전 임상시험에서 발견되지 않았던 드물지만 심각한 부작용이 나타날 수 있다. 따라서 실험적 조건을 가하지 않은 자연상태에서의 약물폭로와 특정한 건강장애와의 관련성을 규명하기 위한 약물역학적 연구가 필요하게 된다(표 2).

약물의 시판이 허용된 이후에 약물역학적 연구를 수행하는 실제적인 이유는 표 3에 제시한 바와 같이, 행정적, 법적, 의학적, 및 상업적 측면에서 나름대로의 다양한 필요성에 근거를 두고 있다. 행정적인 측면에서는 규정을 준수하기 위하여, 시

표 2. 시판전 임상시험과 약물역학적 연구의 비교

시판전 임상시험 (premarketing clinical trial)	약물역학적 연구 (postmarketing surveillance studies)
연구기간이 제한	연구기간이 무제한
연구대상의 수가 한정	연구대상의 수가 무한정
연구대상의 동질성	자연상태의 다양한 연구대상
교란변수를 직접 통제함	교란변수를 직접 통제하지 못하나, 간접 통제 가능
연구비가 많이 듦	연구비가 적게 듦

표 3. 약물역학적 연구를 수행하는 이유

- A. Regulatory
 1. Required
 2. Earlier approval for marketing
 3. Question by regulatory agency
 4. Approval for marketing elsewhere
- B. Legal
 1. Future product liability litigation
- C. Clinical
 1. Hypothesis generating-need depends on :
 - a. Whether it is a new chemical entity
 - b. Safety profile of the class
 - c. Relative safety of the drug in its class
 - d. Formulation
 - e. The disease to be treated, including :
 - 1) Its duration
 - 2) Its prevalence
 - 3) Its severity
 - 4) Whether alternative therapies are available
 2. Hypothesis testing
 - a. based on drug structure
 - b. based on preclinical or premarketing human data
 - c. based on spontaneous reports
 - d. better quantitate the frequency of adverse reactions
- D. Marketing
 1. Assist market penetration
 2. Increase name penetration
 3. Repositioning the drug
 - a. Different outcomes- QOL, economic
 - b. Different type of patients- elderly
 - c. New indications
 - d. Less restrictive labeling
 4. Protect the drug from accusation about adverse effects

판의 조기승인을 위하여, 및 수출대상국에서의 승인을 받기 위한 근거자료가 필요하기 때문에 수행한다. 미국에서는 신약이 개발되어 FDA의 승인을 받기까지 평균 9년정도의 장기간이 소요되기 때문에, 승인기간을 단축시키기 위하여 약물역학적 연구 결과를 제출하는 조건으로 조기승인을 해주는 경우가 점차 증가하고 있다. 법적인 측면에서는 장차

그 약물에 의한 부작용 발생여부가 문제되어 책임소재를 따지게 될 때 필요한 근거자료를 마련하기 위하여 이러한 연구가 필요해 진다. 의학적인 측면에서는 그 약물의 화학적 구조, 그 약물이 속한 약효군의 안전성 및 동일한 약효군내에서 그 약물의 상대적인 안전성, 그 약물의 처방형태, 그 약물의 적응증이 되는 질병의 특성등에 따른 부작용 발생에 관하여 제기된 가설과, 전임상 자료나 시판전 임상시험, 또는 자발적 부작용 신고로 제기된 부작용 발생에 관한 가설을 검증하기 위하여 약물역학적 연구의 수행이 필요해 진다. 또한 제약회사의 입장에서는 신약의 시판을 승인받은 초기에는 임상 의사와 일반인은 그 약물에 관하여 생소할 수 밖에 없는데, 그 약물에 관한 대규모의 약물역학연구를 수행하므로써, 신 제품을 일반인과 임상 의사에게 널리 알리는 결과를 초래하여 결국은 시판을 촉진하는 효과를 가져오기 때문에 이러한 실질적인 선전효과를 기대하고 수행하는 경우가 많다. 또한 시판전 임상시험으로는 파악하지 못하였던 여러가지 새로운 치료효과를 파악하고, 장차 문제될 수 있는 부작용으로 인한 법적 소송을 대비한 자료 수집의 목적으로 수행하기도 한다.

4. 약물역학의 연구설계

약물역학적 연구에는 전통적인 의미의 역학적 연구방법들을 모두 적용할 수 있다. 연구설계의 종류에 따라 연구결과로 도출된 인과관계에 관한 결론의 강도가 달라지는데, 환자사례연구에서 주장되는 인과관계는 설득력이 가장 낮고, 기술적 연구 또는 생태학적 연구, 환자-대조군연구, 코호트연구 및 무작위 임상시험연구의 순으로 그

표 4. 연구설계의 종류별 인과관계에 관한 연구결과의 설득력의 크기

설득력의 크기	연구설계의 종류
가장 약함	환자사례보고
	환자군 연구
	기술적 역학연구 또는 생태학적 연구
	환자-대조군연구
	코호트연구
가장 강함	무작위 임상시험연구

결과에 의한 설득력의 크기가 커진다(표 4).

1) 환자사례보고(Case report)

환자사례보고는 특정한 약물을 복용한 후에 특이한 부작용을 나타낸 환자에 대한 경과를 기술하여 보고하는 것으로서, 특정 약물과 질병발생간의 가설을 제시하는 매우 경제적인 방법이기도 하지만, 단 한명의 환자를 관찰한 것이기 때문에 그러한 부작용의 발생규모를 파악할 수 없을 뿐 아니라 대부분의 경우 인과관계를 검증할 수 없는 것이 단점이다. 그러나, 약물역학적인 측면에서 큰 기여를 할 수도 있다. 즉, 약물복용과 부작용발생간의 시간간격이 그 약물의 약물역동학적 성상과 일치한다든지, 부작용의 특성이 그 약물의 약리학적 특성과 일치한다든지, 용량-반응관계를 보인다면, 약물의 투입을 중단하였을 때 부작용이 소실되었다가 재투여시에 재발하는 양상을 관찰하게 되면 인과관계를 강력히 시사하는 것으로 받아들일 수 있게 된다. 예를 들면, methadone을 과잉투여하여 혼수상태에 빠진 환자에게 길항제인 naloxone을 투여하면 혼수상태에서 깨어났다가, naloxone의 혈중농도가 떨어지면서 다시 혼수상태로 돌아가는 것을 관찰하게 되는 경우 methadone에 의한 혼수상태임을 확인할 수 있게 된다.

2) 환자군연구(Case series study)

환자군연구는 다수의 동일한 질병을 가진 환자들을 대상으로 가능한 원인적 요인들을 평가하고 기술하거나, 동일한 요인에 폭로된 사람들에서 발생하는 여러가지 질병들을 평가하고 기술하는 형태의 연구를 가리킨다. 이러한 형태의 연구는 특정한 약물을 복용한 환자들에서의 부작용 발생빈도를 파악하거나, 원하지 않는 부작용이 발생하였는지를 확인하는데 유용하다. 예를 들면, prazosin을 처음 투여하였을 때 발생하는 졸도의 빈도를 파악할 수 있고, 유럽에서 무과립구증을 유발한다는 이유로 시판이 금지된 metiamide와 화학적 구조가 유사한 cimetidine이 미국에서 시판되고 있기 때문에 cimetidine에 의하여도 같은 부작용이 발생할 것인지를 확인하기 위하여 이러한 연구를 수행할 수 있다. 환자군연구를 통하여 유용한 가설을 제시하게 된

경우는 20세 전후의 젊은 여성에서 발생한 희귀한 질병인 질선암종의 예를 분석하여 환자가 모태속에 있을 때 산모가 복용하였던 DES(diethylstilbestrol)이 원인일 것이라는 가설을 제기한 예를 들 수 있다.

이러한 형태의 연구의 단점은 대조군이 없기 때문에 가설을 검증할 수 없다는 점이다. 예를 들면, 특정 병원에 입원한 동일한 질환자 100명의 특성을 분석하였더니 모두 60세 이상의 남자들이어서 이러한 특성과 관련되는 원인-남성 호르몬의 영향 등을 가설로 제시할 수 있다. 그러나 연구의 대상이 입원한 병원이 미국의 원호병원이었다면, 그러한 가설을 제시하는 것이 얼마나 터무니없는 일인지 자명해 진다. 또 다른 예를 들면, 폐색전증(pulmonary embolism)이 발생한 여성 환자들의 특성을 파악한 결과 30%에서 경구용 피임약을 복용하고 있었다면, 경구용 피임약이 폐색전증의 원인이라고 할 수 있을까? 이 경우에도 폐색전증환자가 아닌 여성으로 이루어진 비교가능한 대조군이 없기 때문에 아무런 결론을 내릴 수 없게 된다. 즉, 대조군에서 경구용 피임약을 복용하는율이 환자군과 차이가 없다면 인과관계를 주장할 수 없게 되고, 대조군에서의 피임약 복용율이 현저히 낮다면 원인적 관련성을 주장할 수 있겠지만, 반대로 대조군에서의 복용율이 현저히 높다면 오히려 보호효과가 있는 것으로 주장할 수도 있기 때문이다.

3) 생태학적 연구(Ecological study)

약물역학에서 생태학적 연구는 약물사용양상의 연도별 변화양상과 그 약물에 의하여 발생한 것으로 추정되는 부작용의 연도별 변화양상간의 관련성을 분석하여 인과관계에 관한 가설을 제기하는데 유용하게 사용되고 있다. 예를 들면, 제약회사의 자료로부터 파악한 경구용 피임약의 연도별 판매량과 정부의 사망원인통계로부터 파악한 정맥 혈전 색전증(venous thromboembolism)으로 인한 연도별 사망률간의 관련성을 분석하여 경구용 피임약과 정맥 혈전 색전증간에 인과관계를 주장하는 가설을 제시할 수 있다. 특히 정맥 혈전 색전증으로 인한 사망률이 가임연령의 여성에서만 경구용 피임약의 판매량과 상관관계가 높게 나타나고, 다른 연령층의

여성이나 남성에서의 사망률과는 전혀 관련성을 나타내지 않는다면 그 가설을 받아들일 수 있는 타당성이 커지게 된다.

생태학적 연구의 장점은 이미 만들어져 있는 자료를 이용하여 분석을 하기 때문에 연구결과를 신속하게 얻을 수 있다는 점이다. 그러나 생태학적 연구의 단위가 개인이 아니고 집단이기 때문에 그 결과를 개인에게 직접 적용하는 경우에 오류가 발생할 수 있다는 점(생태학적 오류)을 들 수 있고, 교란변수의 영향을 보정할 수 없기 때문에 인과 관계를 입증하는데는 취약한 연구설계이다.

4) 환자-대조군 연구(Case-control study)

환자-대조군 연구는 특정한 질병을 가진 환자군과 그 질병을 가지지 않으면서 이들과 유사한 특성을 가진 대조군을 선정하여 두 집단에 속한 사람들의 과거 폭로경험을 비교분석하므로써 질병 발생에 유의하게 관련되는 폭로요인을 밝히고자 하는 연구설계이다. 예를 들면, 정맥 혈전 색전증에 걸린 젊은 여성들을 환자군으로 하고 이들과 유사한 특성을 가진 젊은 여성 가운데 정맥 혈전 색전증에 걸리지 않은 젊은 여성들을 대조군으로 선정한 뒤, 두 집단에서의 과거 경구용 피임약의 복용여부를 파악하여 비교분석하므로써 경구용 피임약과 정맥 혈전 색전증간의 관련성을 규명하고자 하는 연구이다.

환자-대조군연구의 장점은 비교적 드물게 발생하는 부작용에 관하여 연구할 수 있고, 단일한 부작용을 발생시키는 여러가지 요인(약물)들을 동시에 파악할 수 있으며, 비교적 단시간에 적은 연구비로 연구결과를 얻을 수 있다는 점이다. 앞의 환자군 연구에서 예를 든 임신초기에 복용한 DES와 딸에서 발생한 질선암중에 관하여 제기된 가설을

검정하기 위하여, 모두 8명의 환자군과 같은 시기에 동일한 병원에서 태어났던 여자들을 1:4로 짝지어 뽑은 대조군을 연구대상으로 하여, 두 집단의 어머니들이 과거 임신초기에 경험하였던 내용을 파악하여 분석한 결과, DES와 질선암중 발생간의 유의한 관련성을 밝힐 수 있었다.

단점으로는 연구대상이 되는 약물을 사용하는 사람의 수가 적은 경우에는 적용하기 어려우며, 과거에 복용한 약물의 종류와 양을 정확히 파악하기 어려운 경우에는 거의 이용할 수 없다. 또한 약물 복용자를 대상으로 부작용의 발생을 관찰하는 연구가 아니고, 발생된 환자로부터 과거의 약물복용력을 파악하는 연구 형태이기 때문에 약물복용에 따른 부작용의 발생률을 직접 산출할 수 없게 된다. 환자군에 대한 대조군을 선정하는 과정에서 비교성이 없는 사람들을 선정하는 경우에는 선택비뚤림에 의하여 연구결과가 엉뚱하게 나타나게 되며(selection bias), 과거의 약물사용에 관한 정보를 수집하는 과정에서 정확성이 떨어지거나, 환자군과 대조군에서의 정보수집과정이 같지 않으므로써 연구결과가 비뚤어지는 경우(information bias)도 있게 되며, 약물복용과 부작용 발생에 동시에 관련되는 제3의 요인인 교란변수를 적절하게 보정하지 않는 경우에도 결과가 비뚤어 질 수 있다(confounding).

5) 코호트연구(Cohort study)

코호트연구는 연구대상 약물에 의한 부작용을 경험하지 않고 있는 사람을 연구대상으로 선정한 다음, 연구대상 약물을 복용하고 있는 사람들(폭로 코호트)과 그 약물을 복용하고 있지 않는 사람들(비폭로 코호트)을 추적 관찰하여 연구대상이 되는 부작용의 발생률을 비교분석하므로써 특정 약물과

그림 1. 환자-대조군 연구의 연구설계.

부작용발생간의 관련성을 규명하고자 하는 연구이다(그림 2). 현실적으로는 연구대상약물을 처음으로 복용하기 시작하는 사람들을 대상으로 하게 된다. 예를 들면, 정맥 혈전 색전증이 없는 가임여성 가운데 경구용 피임약을 복용하고 있는 사람들을 폭로코호트로 선정하고, 경구용 피임약을 복용하지 않는 사람들을 비폭로 코호트로 선정한 뒤, 일정한 기간동안 추적관찰하여 각 코호트에서의 정맥 혈전 색전증의 발생을 관찰하여 두 코호트에서의 발생률을 비교분석하므로써 인과관계를 규명하게 된다.

코호트연구의 장점은 한가지 약물의 복용으로 인한 여러가지 부작용의 발생여부를 파악할 수 있고, 일반인구집단에서의 특정 약물의 복용빈도가 높지 않은 경우에도 적용할 수 있으며, 약물복용에 관한 정보를 사전에 파악하기 때문에 환자-대조군연구에 비하여 정확히 알 수 있다는 점이 큰 장점이며, 동시에 약물복용과 부작용 발생간의 시

간적인 선후관계가 명확하기 때문에 인과관계의 규명에 매우 유리하다는 점등을 들 수 있다.

그러나, 일반적으로 많은 수의 연구대상자를 필요로 하는데, 특히 발생률이 낮은 부작용과의 관련성을 규명하고자 하는 경우에는 대규모의 연구대상을 필요로 하게 되어 연구수행 가능성이 떨어지게 된다. 장기간에 걸친 약물복용결과 발생하는 부작용을 관찰하기 위하여는 추적관찰기간이 길어지는데, 이 경우에는 연구대상자와 연구자의 도중탈락이 문제가 되며, 연구비도 많이 들게 된다. 추적관찰하는 기간동안에 약물복용의 양과 종류가 변하는 것을 정확하게 측정하기 힘들며, 부작용발생여부와 발생된 부작용의 정확한 진단을 파악하기 어려운 점 등이 코호트연구의 단점이다.

6) 무작위 임상시험(Randomized controlled clinical trial)

무작위 임상시험연구는 사람을 대상으로 하는

그림 2. 코호트연구의 연구설계.

그림 3. 무작위배정법의 전형적인 연구설계.

실험적 연구로서, 연구대상으로 선정된 환자를 치료군과 비교대조군으로 무작위 배정한 다음, 치료 효과를 관찰할 약물을 치료군에 투여하고, 비교대조할 약물 또는 위약을 비교대조군에게 투여하고, 일정한 기간동안을 추적 관찰하면서 그 결과를 평가하여 비교분석하는 연구이다(그림 3). 직접 사람을 대상으로 하는 실험적 연구이기 때문에 연구를 시작하기 전에 윤리적인 문제가 충분히 고려되어야 하고, 가능한 많은 수의 환자를 연구에 포함시킬 수 있는 방법을 개발하여야 하며, 객관적인 연구결과를 얻기 위하여 환자와 의사가 치료내용이 무엇인지를 알 수 없게 하는 방법(blind method), 치료에 대한 순응도(compliance)를 최대한 높이는 방법을 강구하여야 하며, 가능한 많은 환자들을 추적관찰할 수 있도록 대책을 마련하여야 한다.

무작위 임상시험의 장점은 연구대상이 되는 환자들을 치료군과 비교대조군으로 무작위 배정함으로써 비교하고자 하는 두 환자군사이의 비교성을 최대한으로 높이고, 연구결과를 비뚤어지게 만드는 교란변수의 영향을 배제시킬 수 있으며, 실험조건 즉 약물복용 내용을 연구자가 조정할 수 있기 때문에 그 결과는 모든 형태의 임상의학연구로 얻어진 결과 가운데 가장 설득력이 높게 된다.

무작위 임상시험의 단점은 윤리적인 문제로 연구를 수행할 수 없는 경우가 많고, 연구대상환자를 확보하기 어려우며, 연구비가 많이 들고, 엄격한 연구대상선정기준을 적용하기 때문에 연구결과를 일반화하기 어려운 점과 연구수행과정이 매우 복잡하여 실제 수행하는데 많은 문제점이 발생한다는 점들을 들 수 있다.

5. 약물역학의 연구자료(Databases for Pharmacoepidemiologic study)

약물역학연구에 이용되는 자료에는 첫째 전화면접조사, 우편설문조사, 직접면접조사 등 설문지를 이용하여 수집되는 자료, 둘째 병원의 의무기록지를 통하여 수집되는 자료, 셋째 컴퓨터에 입력되어 데이터베이스화된 자료 등을 들 수 있다. 효과적인 약물역학연구를 수행하기 위하여는 대규모 인구집단을 대상으로 하여 장기간에 걸쳐 약물복용과

질병발생에 관한 정확하고 포괄적인 정보를 수집할 수 있어야 하는데, 그 해결책의 하나는 이미 작성되어 있는 컴퓨터 데이터베이스를 이용하는 방법이다. 행정목적으로 개발되어 있는 행정통계자료 등의 데이터베이스, 의료보험단체의 진료비심사를 위하여 청구된 진료명세서를 입력한 데이터베이스, 의료기관에서 환자에 대한 각종 임상검사결과, 방사선검사등의 진단결과, 수술 및 약물치료내용, 환자의 경과등의 진료내용을 담은 데이터베이스 등을 개인단위로 연결하므로서(record linkage), 짧은 시간내에 적은 연구비로 대규모 인구집단을 대상으로 하는 경시적인 약물역학연구가 가능해진다. 최근 10여년동안 미국과 유럽 각국에서는 발전된 컴퓨터시스템을 이용하여 다국가간 공동연구의 형태로 신약의 시판후에 약물의 사용 양상을 관찰하고 약물과 건강간의 관련성을 규명하고자 하는 약물역학연구가 활발히 수행되고 있다.

1) 컴퓨터 데이터베이스의 장점

진료비를 청구하기 위하여 의료보험단체에 송부되는 진료명세서는 진료비심사가 끝난 다음, 컴퓨터에 입력되어 일정한 기간동안 보관된다. 이러한 데이터베이스에는 미국을 비롯한 선진국에서는 환자의 인적사항과 진단명, 약물처방내용, 치료내용등이 입력되기 때문에 약물역학적 연구를 수행하기에 매우 유용한 자료가 되고 있다. 컴퓨터 데이터베이스를 약물역학적 연구에 이용하는 경우에는, 연구대상이 되는 인구집단이 명확히 규명되기 때문에 약물복용으로 인한 부작용의 발생률을 산출할 수 있고, 약물처방내용을 정확히 파악할 수 있으며, 대규모 인구집단에서 일어나는 약물치료내용 및 그 결과를 경시적으로 관찰하는 것이기 때문에 흔히 처방되지 않는 약물에 의한 부작용이나, 드물게 발생하는 부작용을 관찰할 수 있다. 특히 특정한 약물에 의한 부작용이 단기간내에 수술이나 특별한 내과적 치료를 요하는 상태인 경우에는 인과관계를 규명하기가 매우 용이하다. 예를 들면, 항정신성 약물 또는 이노제를 복용한 노인환자들에서 대퇴부골절(hip fracture)이 발생하는 위험도가 증가하여 입원수술을받는 환자가 늘어난 경우에 이를 파악하기는 비교적 쉽다. 또한 대부분의 진단이

각종 검사결과에 의하여 이루어진 것이어서 객관성이 높고, 연구관찰기간에 제한이 없기 때문에 장기간에 걸친 부작용발생여부를 확인할 수 있으며, 이미 작성되어 있는 자료를 이용하기 때문에 연구비가 적게 든다는 점들을 장점으로 들 수 있다(표 5).

2) 컴퓨터 데이터베이스의 문제점

약물역학연구에서 컴퓨터 데이터베이스를 이용하는 경우에 문제점도 많이 발생한다. 약물에 의한 부작용이 발생하여도 병원에서 진료를 받지 않는 경우에는 파악될 수 없고, 그 부작용의 특성이 기존의 질병분류체계-예를 들면, 국제표준질병분류인 ICD-9-CM-에 의하여 적절히 분류될 수 없는 경우에는 데이터베이스를 이용한 연구를 수행할 수 없게 된다. 대부분의 데이터베이스는 의료보험단체에서 진료비심사 및 지불을 위한 행정적인 목적으로 개발된 것들이어서 입력된 정보의 보관기간이 짧고, 입력된 정보의 수가 제한되기 때문에 이러한 자료를 이용하여 약물과 부작용발생에 관한 가설을 검증하기 위한 분석적 연구(analytic study)를 수행하기는 힘들고, 기술적 연구(descriptive study)의 수준에 머물러야 하는 경우가 많다. 예를 들면, 가설검정을 위하여 필수적으로 요구되는 교란변수에 관한 정보가 입력되어 있지 않은 경우에는 가용한 데이터베이스에 입력된 정보만으로는 적절

한 분석을 할 수 없기 때문에, 교란변수에 대한 정보를 얻기 위한 추가적인 자료수집과정을 거쳐야 타당한 결론을 내릴 수 있다. 제한된 컴퓨터의 용량때문에 대규모의 정보를 장기간 보관할 수 없어 경시적 연구(longitudinal study)를 수행하기가 불가능하였으나, 최근 컴퓨터의 용량이 기하급수적으로 커지고 있어 이 문제는 비교적 쉽게 해결될 전망이 커지고 있으며, 현재의 시스템에서도 일정한 주기로 입력된 내용을 마그네틱 테이프나 카트리지에 보관해 나가면서 필요한 정보만을 연결하여 연구를 수행할 수는 있다. 의약분업이 정착되어 있는 선진국에서도 의사의 처방없이 구입할 수 있는 소위 OTC(over-the-counter) 약물이나, 의약분업이 아직 이루어지지 않고 있는 개발도상국가들에서는 병의원을 이용하지 않고 약국에서 직접 구입하여 복용하고 있는 약물에 대하여는 컴퓨터 데이터베이스를 이용한 약물역학적 연구를 수행할 수 없게 된다(표 6).

6. 약물역학의 기여내용(Contribution of Pharmacoepidemiologic study)

약물역학연구를 수행함으로써 환자에 대한 적절한 약물요법에 기여하는 바는 표 7에 제시한 바와 같이 매우 크다. 첫째, 새로운 약물을 개발하여 정부로부터 시판을 승인을 받기 위하여 그 약물의 안전성과 유효성을 평가하는 과정에서 알게 된

표 5. 약물역학연구에 컴퓨터 데이터베이스를 이용하는 경우의 장점

Denominators needed for calculating incidence rates
Can study uncommon exposures and/or uncommon outcomes
Without recall and interviewer bias
Short-term drug effects, especially required specific therapy
Objective, laboratory-driven diagnosis
When time is limited
When budget is limited

표 6. 약물역학연구에 컴퓨터 데이터베이스를 이용하는 경우의 문제점

Cannot study illnesses not reliably come to medical attention
Cannot study outcomes poorly defined by ICD-9-CM coding system
Cannot study delayed drug effects
Important confounders not recorded in the database
Descriptive studies
Cannot study over-the-counter drugs

표 7. 약물역학연구가 기여하는 내용

Better quantification of known adverse and beneficial effects ;
Higher precision
Broader coverage-the elderly, children, pregnant women
As modified by other drugs & other illnesses
Relative to other drugs used for the same indication
New types of information ;
Discovery of previously undetected, uncommon, and delayed adverse and beneficial effects
Patterns of drug utilization
Effects of drug overdoses
Economic implications of drug use
General contributions ;
Reassurance about drug safety
Fulfillment of ethical and legal obligations

약물의 이름거나 해로운 효과의 발생수준을 더욱 잘 정량화할 수 있다. 즉, 시판후 약물역학연구는 훨씬 큰 인구집단을 대상으로 삼게 되고, 일단 약물이 시판되면 그 약물을 복용하는 사람들에 대한 엄격한 제한을 가하기가 현실적으로 불가능하기 때문에 연구대상의 제한이 없어지게 되어, 노인, 소아를 비롯하여 심지어 임신부까지 약물을 복용하게 되므로, 약물의 효과에 대한 폭넓은 정보를 얻을 수 있다. 시판전에는 단일한 적응증에 대한 치료효과만을 평가하였지만, 실제상황에서는 두가지 이상의 질병에 걸려 있는 환자가 동시에 여러 다른 약물과 함께 복용할 수 있기 때문에, 다른 질병에서의 치료효과를 파악할 수 있게 되고, 동시에 다른 약물과의 상호작용 여부등도 파악할 수 있게 된다. 또한 동일한 적응증에 대한 다른 약물과의 상대적인 치료효과를 비교할 수도 있게 된다.

둘째, 그 약물에 관한 새로운 정보를 얻게 된다. 약물이 시판된 후에 많은 수의 환자들이 장기간에 걸쳐 복용하게 되므로 시판전에는 파악하지 못하였던 희귀한 부작용과 장기복용으로 인하여 발생할 수 있는 부작용들을 파악할 수 있다. 시판후 실제 환자진료에 어떻게 처방되고 있는지를 파악할 수 있고(drug utilization review), 약물의 오,남용으로 인한 효과를 평가할 수 있으며, 그 약물의 사용으로 인한 보건경제학적(pharmaco-economic)인 효과의 분석도 가능해 진다.

셋째, 보다 일반적인 기여는 약물역학연구를 통하여 새로 개발된 약물의 안전성에 관하여 확신을 가질 수 있게 되고, 제약회사로서는 그 약물을 사용하게 될 인구집단에 대한 윤리적이고 법적인 의무를 충실하게 이행하는 결과를 가져온다.

7. 우리나라에서의 약물역학연구

1) 약물역학연구의 수행여건

우리나라에서는 약물역학연구를 수행하여야 하는 필요성이 대단히 큼에도 불구하고 실제로 연구를 수행하기는 현재로서는 매우 힘들다. 왜냐하면, 아직 우리나라에서는 약물처방내용이 컴퓨터 데이터베이스화 되어 있지 않기 때문에, 그러한 자료를 이용할 수 없다. 따라서 선정된 연구대상을 상대로 면접조사를 시행하여 과거 또는 최근 일정기간 동안의 약물복용내용을 파악할 수 밖에 없는데, 우리나라에서는 아직 의약분업이 이루어져 있지 않아서 환자 본인은 자신이 무슨 약물을 얼마나 복용하고 있는지 또는 과거에 복용하였는지를 알지 못하기 때문에 약물역학연구에 필요한 객관적인 약물복용 자료를 얻을 수 없어 결국 타당한 연구를 수행하기가 매우 힘든 실정이다.

개방화에 따라 외국에서 개발된 약물이 더욱 물밀듯이 쏟아져 들어올 것을 예상할 때, 이에 대응하여 우리나라에서도 자체적인 신약의 개발에 박차를 가하고 있는 현 시점에서 약물역학연구를

활성화하는 것은 매우 시급한 과제라고 판단된다.

2) 약물역학분야의 활성화

약물역학분야를 활성화하기 위하여는 무엇보다 먼저 약물역학연구를 타당하게 수행할 수 있는 능력을 갖춘 전문가를 양성하는 것이 시급하다. 그러기 위하여는 의과대학을 비롯한 3차의료기관에서 활동하고 있는 기존의 역학자나 임상약리학자 가운데 지원자를 관련되는 해외 학술기관 및 제약회사등으로 연수시켜 전문가로 양성하여 활용하고, 의료기관에서는 자체 fellowship제도를 확립하여 전문가를 양성해 나가도록 한다. 단기적으로는 3차의료기관급에 약물역학부서를 설치하여 약물역학연구를 수행할 수 있도록 하므로써, 약물요법의 수준을 향상시키도록 하여야 할 것이며, 장기적으로는 병원급이상의 의료기관과 보건사회부에 관련 부서를 두어 발전시켜 나가야 할 것이다.

전문가의 양성과 제도적인 뒷받침으로 약물역학의 발전기틀을 마련하는 동시에, 의료보험기관의 진료비청구서 내용과 의료기관의 진료내용의 전산화 작업을 병행하여야 할 것이다. 데이터베이스에는 전체 진료내용 또는 일부 선택된 내용이 입력되어야 할 것이며, 구체적인 입력내용은 환자의 인적사항, 약물처방내용, 임상검사결과 및 진단명 등의 주요 필수정보들과 환자의 과거질병력, 음주, 흡연 등의 잠재적인 교란변수에 관한 정보들이 포함되어야 한다. 이러한 정보를 포함하는 데이터베이스를 구축하기에는 기존의 행정처리용 컴퓨터 용량만으로는 부족하여 용량을 늘이기 위한 추가적인 투자가 필요할 수도 있겠지만, 약물의 부작용으로 인한 대형 약화사고를 미연에 예방하고, 약물요법의 수준을 향상시키므로써 환자의 치료에 도움이 되는 측면을 정당화하여 비용-효과분석을 해본다면 부정적이지는 않을 것이다. 또한 정부에서는 현재 신약개발에 쏟고 있는 지원이 성과를 거두어 실제 우리나라에서 신약이 개발되더라도, 그 유효성과 안정성을 타당하게 평가해 줄 수 있는 약물역학분야의 발전없이는 국민보건의 향상이라는 소기의 목적을 적절하게 달성하기 어렵기 때문에 약물역

학연구의 활성화를 위한 각종 지원을 아끼지 말아야 할 것이다.

References

- 1) Dick RS, Steen EB, ed. *The computer-based patient record : An essential technology for health care.* National Academy Press, Washington, D.C., 1991
- 2) Heidrich FE, Stergachis A, Gross KM. *Diuretic drug use and the risk of hip fracture.* Ann Intern Med 1991 ; 115 : 1-6
- 3) Feinstein AR. *Clinical Epidemiology : The architecture of clinical research.* W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1985
- 4) Hartzema AG, Porta MS, Tilson HH. *Pharmacoeconomics : An introduction.* 2nd ed. Harvey Whitney Books Company, Cincinnati, OH, 222-235, 1991
- 5) Manasse HR Jr. *Medication use in an imperfect world : drug misadventuring as an issue of public policy, part 1.* Am J Hosp Pharm 1989 ; 46 : 929-44
- 6) Meinert CL, Tonascia S. *Clinical Trials : Design, conduct, and analysis.* Oxford University Press, New York, 1986
- 7) Ray WA, Griffin MR, Downey W. *Benzodiazepines of long and short elimination half-life and the risk of hip fracture.* JAMA 1989 ; 262 : 3303-7
- 8) Spilker B. *Guide to clinical trials.* Raven Press, New York, 1991
- 9) Spitzer WO. *Drugs as determinants of health and disease in the population : an orientation to the bridge science of pharmacoepidemiology.* J Clin Epidemiol 1991 ; 44 : 823-30
- 10) Strom BL. *Pharmacoepidemiology.* Churchill Livingstone, New York, 3-26, 1989
- 11) Strom BL, Carson JL. *Use of automated databases for pharmacoepidemiology research.* Epidemiol Rev 1990 ; 12 : 87-107
- 12) Weiss NS. *Clinical Epidemiology : The study of the outcome of illness.* Oxford University Press, New York, 1986