소아 임상 약리학

박 민 수

= Abstract =

Pediatric Clinical Pharmacology

Min Soo Park

Dept of Pediatrics and Clinical Pharmacology, Yonsei University, College of Medicine, Seoul, Korea

Do we need clinical pharmacology in children? Are children really different from adults in pharmacokinetic as well as pharmacodynamic responses? Should we conduct clinical trials in children?

These are the questions frequently asked when we talk about drug uses in children. Especially in dealing with the ethical problems in clinical trials involving special age groups, there have been myriad different viewpoints about the pros and cons.

The answer really lies in acknowledging that children, especially younger ones such as newborns, including premature babies, and infants, are not just a diminution of adults, but a dynamically evolving being with so much variation in structure and function that lest we study and treat them separately, we are placing ourselves in a difficult position where our clinical practice cannot be justified.

No doubt clinical pharmacology is necessary in children, because children need medicines. If we were to use medicines in children, we have to know the exact dose to be administered, what the fate of that drug would be in the body, what the effect of the drug on the body will be, and what kinds of adverse events may occur and be expected, as in adults. Although it is generally recognized that there exist pharmacokinetic and pharmacodynamic differences, only limited works on these aspects in children have been advocated because of various reasons such as ethical controversies and the question whether investment into these would be profitable.

연세의대 소아과/임상약리학과

교신저자 : 박민수

영동세브란스병원 소아과

서울시 강남구 도곡동 146-92 우) 135-270

TEL : (02) 3450-3352 Fax : (02) 556-9473

Would it be ethically acceptable to use in children without proper controlled clinical trials drugs that are well-studied and proven safe in adults, considering the fact that clinical pharmacology in children is different, at least in part? Or should we perform studies on children who will not benefit directly from the results of the study? Would you expose your own children to investigational new drugs? How do we weigh risk and benefit?

The questions are difficult to answer. Nevertheless, the pediatricians and clinical pharmacologists in the world have been under increasing pressure that calls for the proper clinical trials in children. FDA and American Academy of Pediatrics in USA, as well as pediatric societies in Britain and Europe, encouraged these studies to be performed and set the guidelines as early as in 1977. After almost 20 years of neglect, the pediatric clinical pharmacology has got attention just recently. And FDA is trying to resolve problems hindering the efficient execution of clinical trials in children.

Therefore, it is evident that, as we should realize interindividual variations even in adults and try to optimize drug therapies for individual patients, we also should respect the different needs to be satisfied treating children.

임상약리학이란 임상 진료와 기초 약리학을 접목하여 약물 치료의 최적화를 꾀하는 학문으로서 임상에서 약물치료를 시행하는 모든 분야에서 임상약리학이 필요하듯이 소아과 영역에서도 예외는 아니다. 성인에서는 새로운 약물이 개발되어 시판되기까지 전임상시험이 끝난후 제 1, 2, 3 상의 임상시험을 거쳐 그 약물의 약물동태학적 및 약력학적 정보가 수집되며 어떠한 질환에 어떤 용량으로 어떻게 투여되어야 적합하며 나타나는 효능 및 부작용까지도 연구가 되어 약물사용에 어려움이 별로 없다. 그러나 소아에서는 성인에서와 같은 연구가 적절하게 시행되지 못하여 대부분의 약제는 소아에 대한 정보가 미비한 상태로서 사용상의 문제점을 안고 있다. 소아에서도 물론 임상약리학의 필요성은 인정이 되면서도 성인에서처럼 발전하지 못한 이유로

윤리적 및 기술적 문제를 들 수가 있다. 특히 소아는 출생에서부터 사춘기까지 지속적으로 많은 변화를 겪는 격동기에 있기 때문에 어려움이 가중된다. 그러나 궁극적으로 소아에서도 약물치료가 시행되어야 하며 그것도 적절하게 시행되어야 함은 두말 할 나위가 없다. 즉, 소아에서 사용되는 모든 약제에 대해서는 소아를 대상으로 필요한 정보를 획득하여야 하는데 이에 필요한 것이 소아를 대상으로 시행하는 제대로 디자인된 임상시험이다. 또한 이들에게서 약물치료를 최적화하기 위하여 약물의 흡수 및 생체이용률, 분포, 대사 및 배설 등의 약물동태학적 정보 뿐만 아니라 약력학적 정보, 치료 약물 농도 모니터링, 약물 관련 부작용 등에 대한 정보를 얻기 위한 일련의 연구를 진행시켜야 한다. 최근 세계적으로 이러한 연구의 필요성이 부각되고 있으며 이는 매우 바람직한 현상으로 받아들여 지

고 있다. 이 글의 전반부에서는 소아에서의 신약 임상 시험의 필요성과 배경에 대하여 소개하며 후반부에는 약물치료의 최적화에 필요한 정보에 대하여 논하고자 한다.

A. 소아에서의 임상 시험 : 필요성 및 주의사항

1996년 초 미국 소아과 학회에서는 미국 의회에 제출한 청문회 자료에서¹⁾ 소아에서의 임상 시험의 필요성을 강조하였는데 그 글의 골자가 바로 “소아는 단순히 어른의 축소판이 아니다”라는 표현으로 시작하여 소아가 성인과 다르다는 점을 재천명 하였다. 다시 말하면 소아에 있어서는 약물동태학적으로나 약력학적으로나 모두 성인과 다르다는 것이며 그렇기 때문에 소아에서의 약물 임상시험이 꼭 필요하며 정부, 의약계, 및 국민들의 이해와 적극적인 도움이 필요함을 강조하였다.

역사적으로 미국의 약물 규제법의 발전상을 보면 임상 약리학이 자리잡고 발전하게 된 데에는 아이들의 희생이 있었음을 찾아볼 수 있다. 1938년 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act가 제정되게 된 것은 sulfanilamide를 복용하고 107명의 소아가 사망한 사건이 있는 후였고 1962년 약물의 안전성 및 효능을 신약 등록의 조건으로 지정한 개정 법령인 Kefauver-Harris

Amendment가 제정되기 전에는 세계적인 thalidomide에 의한 비극이 있었다²⁾. 이렇듯 시판 전에 약물의 안전성, 특히 부작용 여부를 밝히는 것이 중요하며 동시에 적정 사용에 대한 정보를 제시하여야 한다는 것을 깨닫게 되었다.

앞서 언급한 대로 소아에서는 성인과 비교하여 모든 면에서 큰 차이가 있다. 그 예로 diazepam의 반감기를 비교해 보면 미숙아에서는 38-120시간인데 반해 1개월 된 신생아는 10-12시간, 성인은 24-48시간으로 연령층에 따라 매우 다양하게 나타난다. 또한 동시에 같은 연령층 내에서도 차이가 많은 것을 알 수 있다. (Table 1)³⁾ Digoxin의 경우 나이에 따라 digoxin의 용량과 혈중 농도의 차이가 있음을 볼 수 있는데, 생후 6-12개월에는 성인에서와 같은 농도인 1.2ng/ml를 이루기 위해서는 성인 용량인 5μg/kg의 약 3배 이상의 용량인 16μg/kg가 필요하지만 생후 1개월 까지는 이 용량보다 훨씬 적은 10μg/kg으로도 혈중 농도는 훨씬 높은 2.7ng/ml에 도달한다. (Fig. 1.)

그러나 이렇게 다르다는 것을 밝혀 내기 위해서는 소아를 대상으로 연구를 진행시켜야 하는데 그러기 위해서는 먼저 해결해야 할 윤리적 문제가 있다. 1978년에 National Commission for the Protection of Human Subjects of Bio-

Table 1. The half-times of diazepam and phenytoin at different ages

Age group	Half-time	
	Diazepam	Phenytoin
Premature	38 - 120h	30 - 60h
Full term	22 - 46h	
Infants of one month	10 - 12h	2 - 7h
Children of 1-15y	15 - 21h	2 - 20h
Adults	24 - 48h	20 - 30h

Fig. 1. Alteration of serum digoxin concentrations for different daily doses at various ages.

medical and Behavioral Research에서는 소아에서의 연구에 대해 몇 가지 지켜져야 할 사항을 제시하였다⁴⁾. 서론에서는 역사적 사건들 중 윤리적으로 부당한 실험을 예로 들었는데 그 중의 하나가 영국 여왕 Caroline이 Jenner의 종두 예방접종 효과를 보기 위해 먼저 고아를 대상으로 실험한 것이다. 1949년에 공표된 Code of Nuremberg는 자발적 동의를 원칙으로 함으로써 소아를 연구 대상에서 제외시켰으나 1964년 Declaration of Helsinki에서는 대리인의 동의로 이를 가능케 하였다. 소아를 대상으로 한 연구는 끊임없이 법적, 윤리적 논란을 일으켰는데 대표적인 견해로는 '정상아를 연구에 이용하는 것은 절대 윤리적으로 정당화 될 수 없다'는 것과 '소아들도 속해 있는 사회에 유익을 주는 데 일부의 책임이 있으므로 위험 요소가 적은 경우 연구 대상이 될 수도 있다'는 견해이다. 또한 소아를 대상으로 한 연구를 시행함에 있어서도 대리인 동의의 적법성 여부 및 위험도-유익성 (risk-benefit) 평가의 적절성에 대한 문제도 중요한 안전으로 제시되고 있다. National Commission이 제시한 권장 사항 중 첫째는 소아를 대

상으로 하는 연구는 소아의 건강과 복지를 위하여 매우 값지고 필수적인 것이며 윤리적으로 합당하게 행해질 수 있다는 점을 강조하고 있으며 그러기 위해 갖추어야 할 조건들을 제 2항에 나열하였는데 가장 중요한 것이 그 연구가 과학적으로 충분한 근거를 가지며 유의한 것이어야 한다는 점이다. 그리고 될 수 있으면 동물이나 성인 또는 나이든 소아에서 먼저 시험을 하며 되도록 안전한 방법을 사용하여 위험을 최소화 하여야 한다는 것이다.

위험도에 대한 개념은 정신적, 육체적 평안을 깨뜨리는, 불편한 또는 통증을 동반하는 것을 정도의 차이에 따라 negligible risk, minimal risk, 및 more than minimal risk로 구분한다. 또한 유의성은 치료 목적과 비치료 목적 연구로 나누어 설명할 수 있는데 기본적으로 비치료 목적 연구는 본인에게는 유익이 없지만 다른 소아나 성인에게 유익이 가거나 기초 생물학적 지식을 증가시키는 데 기여하는 것을 말한다⁵⁾.

모든 임상 시험을 하기 전에 꼭 잡고 넘어가야 할 것이 있는데 첫째가 '정말 이 연구가 필요한 것인가?' 혹은 '이미 다른 연구를 통해 밝혀진 바가 아닌지?'를 재확인 하여야 하며 둘째는 이 연구의 디자인이 최소의 대상 환자의 수와 최단 기간에 통계학적으로 의미 있는 결과를 낼 수 있는지를 살펴봐야 한다.

그런데 그동안 소아에 있어서 약물 시험이 되어 있지 않은 이유는 무엇인가?⁶⁾ 1963년 Dr. Shirkey는 소아를 "therapeutic orphan"이라 명명하였는데 이는 소아가 치료의 혜택을 제대로 받지 못하는 상황을 표현한 것이다. 이렇게 될 수 밖에 없었던 요인은 제약회사 측에서 소아를 대상으로 임상 시험을 시행하는 것이 경제성이나 수익성이 떨어지므로 동기부여가 잘 안된다는 점과 성인보다 임상 시험을 시행하기가 어렵

고 정상 지원자를 얻기가 힘들다는 점이다. 그 외에도 예민한 약물 분석 방법의 부재, 복수 혈액 채취의 어려움 등의 문제도 들 수 있다. 현재 상황은 대부분의 약물설명서에 성인에서는 제대로 연구되어 약 용량 및 효능, 부작용에 대한 정보가 충분한 반면 소아에 대해서는 안전성과 효능이 확립되어 있지 않다는 책임 회피 조항만 난무하는 실정이다. 즉 소아과 의사로서는 치료에 도움이 될 만한 약물인 경우 안전성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 않을 수도 없고, 안전성이나 효능에 대한 검증 없이 단순히 모험적으로 또는 경험적으로 사용할 수도 없는 진퇴양난에 빠지게 된다. 최근 미국 FDA에서는 약물 설명서에 소아에서의 사용을 허용하는 조건을 완화하는 안을 제시하였고 소아에서의 임상 시험을 활성화 하기 위해 노력하고 있다.

요약해 보면, 소아에서 임상 시험을 시행해야 하는 필연성은 임상적으로 소아를 대상으로 진단 및 치료를 시행할 때 성인에서와 마찬가지로 약물을 사용할 수밖에 없기 때문이다. 대부분의 약물은 성인에서는 연구가 충분하지만 막상 소아에서 사용할 때는 적정 용량이 얼마이며 어떻게 사용해야 하는지 또는 어떤 부작용이 가능한지 알 수가 없고 특히 소아에 특징적인 질환에만 쓰이는 약물은 더욱 그렇다. 즉, 소아를 대상으로 임상 시험을 실시하여 이러한 정보를 미리 확립한 후 임상에서 사용하는 것이 적정 진료에 절대적으로 필요하다.

소아 임상 시험을 진행함에 있어서 고려해야 할 사항 중에는 우선 예기치 못한 독성을 밝혀낼 필요가 있다는 것과 소아에 알맞은 특수한 기술의 개발 및 연령별 특성에 따라 필요한 변화 또는 수정을 용납하는 유연성이 요구된다⁷⁾.

각 연령군 별로 특성을 살펴보면 우선 신생아기(출생-1개월)에는 전반적으로 대사가 저하되어

있고 약물에 대한 감수성이 증가되어 있다. 그 밖에도 체중에 비해 체표면적이 상대적으로 크며, 혈청 단백질 및 단백질 결합 친화력의 변동, 태아성 혈색소의 존재, 신기능의 저하, 약력학적 반응의 변화, 주변 온도 변화에 민감한 체온 변화 및 재태기간에 따른 지방과 수분 함량의 변동 등을 고려해야 한다. 유아기(1개월-2세)에는 신체적 성장이 매우 빠르며 모든 장기의 기능이 성숙되어 가는 단계임을 고려해야 한다. 특히 신생아와 마찬가지로 되도록 비침해적 방법을 사용하여 약물 농도를 측정하고 효능을 확립하는 방법을 고안해야 한다. 아동기(2-12세)에는 성장 속도는 조금 늦어지지만, 감염 질환의 발병률이 가장 높기 때문에 감염성 질환과의 상호작용도 고려해야 한다. 그 외에도 운동성이나 사회적 발달에 있어서 더욱 독립적이 되어 외부 환경의 위험에 노출될 확률이 높다는 것도 염두에 두어야 한다. 또한 아동기의 말기에는 골 성장이 빨라지며 골단의 성숙이 시작된다. 사춘기(12-18세)는 소아에서 성인으로 성숙되어 가는 과도기로서 성장의 막바지에 달하고 제2차 성징이 출현하게 되는데 특히 이 시기의 생리적 변화가 약물동태학적/약력학적 측면에 어떤 영향을 줄지 그리고 성 호르몬이 약물 대사에 미치는 효과 등도 고려해야 한다. 또한 약물이 신체적, 내분비적 발달의 마지막 단계에 어떤 효과를 나타낼 지에 대한 안전성 평가가 필요하다. 그 밖에도 약물의 남용이나 순응에 대한 문제 등도 감안해야 한다.

B. 약물 치료의 최적화에 필요한 정보

우선 약물동태학적 측면을 살펴보면, 약물의 흡수에 영향을 주는 요소들을 들 수 있다. 그 중 위액 산도는 출생 시에는 중성이지만 곧 pH 1.5-3.0으로 떨어지며 생후 첫 10일 동안은 산도

가 가장 높으나 10-30일 사이에는 가장 낮아진다. 이것은 생후 3개월 경에 성인 수준에 이른다. Gastric emptying time 및 장 운동 또한 흡수에 영향을 주는데 신생아기에는 특징적으로 연동 운동이 불규칙하고 예측이 어렵지만 전반적으로 성인에서 보다 연장되어 있다. 생후 6-8개월에 성인치에 도달한다. 췌장 효소(lipase, amylase 등)의 활성도도 출생 시, 특히 미숙아에서는, 전반적으로 떨어져 있다. 즉, 신생아기에 약물을 경구 투여 할 경우 이와 같이 흡수에 영향을 주는 요소들을 고려하여야 한다⁸⁾.

피부를 통한 약물 투여 시에는 어릴수록 흡수가 잘 되는 편인데 그 증거로서 신생아기에 피부 도포 후 나타난 독성에 대한 보고(hexachlorophene, aniline함유 소독제, hydrocortisone 등)를 들 수 있다. 피부 흡수는 피부의 수화도(hydration)에 비례하며, 각질층의 두께에 반비례한다⁹⁾. 특히 신생아에서는 체표면적 : 체중 비가 성인에 비해 3배에 달하며 이에 따라 체중 기준의 동일 용량을 피부를 통해 투여한 경우 생체이용률은 3배나 된다.

약물의 체내 분포도는 목표하는 약물의 농도를 이룩하기 위해 최적의 용법을 결정하는데 사용될 수 있으며 약물분포용적 Vd(apparent volume of distribution)은 혈중 농도와 연관되어 체

내에 존재하는 약물의 총량을 가늠할 수 있는 지표이다. 이에 영향을 주는 요인 중 체내 수액의 구획(body water compartment), 단백 결합능, 혈액학적 지표인 심박출량, 지역적 혈류, 막 투과도 등이 신생아, 영유아, 소아 및 성인에서 각각 다르게 나타나는데 이를 고려하여야 약 용량을 적절하게 조절할 수 있다. 즉, 표 2에 나타난 바와 같이 total body water가 미숙아에서는 체중의 85%에 달하는데 비하여 신생아에서는 70%, 젊은 성인에서는 60%이며, 미숙아에서는 세포외액이 세포내액보다 많으나 성인에서는 그 반대이다. 또한 지방 함유량도 미숙아에서는 1%에 불과하지만 성인에서는 20%까지 증가한다. 그러므로 수용성 또는 지용성 약물의 체내 분포에 커다란 영향을 미친다. (Table 2)

약물은 유리형(free, unbound form)이 조직 내로 분포되며 수용체에 결합하는데 이는 총 백량, 결합 가능한 부위, 단백질에 대한 친화력, 단, 병태생리학적 상태, 내생 물질(endogenous substances)의 존재 여부 등과 같은 연령과 관계된 변수에 따라 좌우될 수 있다. 즉, 신생아기에는 총 단백 및 알부민치가 떨어져 있음을 주목해야 한다. 반대로 불포합 빌리루빈 및 유리 지방산은 증가되어 알부민 결합 부위를 두고 약물과 경쟁하게 된다. (Table 3)

Table 2. Relative amounts of body water and fat at different ages³⁾

	Total body water (% of weight)	Extracellular fluid (% of weight)	Intracellular fluid (% of weight)	Fat (% of weight)
Premature	85	50	35	1
Full-term neonate	70	40	30	15
Infant(6 mo)	70	35	35	15
Child	65	25	40	15
Young adult	60	15	45	20
Elderly adult	45	10	35	10

Table 3. Physiologic variables influencing drug-protein binding in infancy and childhood¹⁰⁾

Parameter	Patient Age Group		
	Neonate	Infant	Child
Total protein	Decreased	Decreased	Equivalent
Plasma albumin	Decreased	Equivalent	Equivalent
Fetal albumin	Present	Absent	Absent
Plasma globulin	Decreased	Decreased	Equivalent
Unconjugated bilirubin	Increased	Equivalent	Equivalent
Free fatty acid	Increased	Equivalent	Equivalent
Blood pH	Low	Equivalent	Equivalent
α 1-Acid glycoprotein	Decreased	Data not available	Equivalent

특히 빌리루빈은 알부민에 noncovalent bonding을 하며 신생아에서는 알부민에 대한 친화력이 떨어져 있어 특정 약물에 의해 치환되어 핵황달의 위험도를 높인다.

약물 대사 측면에서 볼 때 Phase I 대사에 관여하는 약물-산화 효소의 태아 간 내의 농도는 성인과 유사할 지 모르나, 그 활성도는 감소되어 있다. CYP 450은 빨리 성숙되어 생후 6개월이면 그 활성도도 성인치에 이른다. 그외 alcohol dehydrogenase 활성도 및 가수분해 효소가 신생아기에 감소되어 있다. Bromosulphthalein의 hepatic clearance는 출생시에는 성인치의 약 1/3~1/2 정도 이던 것이 생후 약 1세 경에는 성인치에 도달한다. 한편 연령에 따라 대사경로가 달라지기도 한다. Theophylline 같은 경우는 미숙아나 만삭아에서는 거의 전혀 대사되지 않은 상태로 뇨로 배설되지만 성인이 되면 1, 3-dimethyluric acid 등으로 대사되어 배설되며 diazepam은 신생아에서는 산화효소 활성도가 저하되어 있으나 나이가 들에 따라 활성도가 증가됨을 알 수 있다. (Fig. 2)¹¹⁾ Phase II대사도 마찬가지로 활성도가 떨어져 있는데 특히 glucuronidation은 신생아기에 많이 떨어져 있어 gl-

ucuronidation에 의해 대사되어 배설되는 약물은 체내에 축적되어 독성을 일으킬 수도 있다. 그 예로서 chloramphenicol을 성인 용량에 기준하여 체중 kg당 계산된 용량을 투여하여 "Grey baby syndrome"이란 치명적인 부작용을 일으키기도 하였다¹²⁾. Phase I 대사와 마찬가지로 Phase II 대사의 활성도 또한 연령에 따라 변화하는데 신생아기에는 glucuronidation은 저하되어 있으나 대신 glycine이나 sulfate conjugation이 보상적으로 증가되어 있고 나이가 들에 따라 glucuronidation은 증가하며 sulfation이나 glycine conjugation은 감소함을 볼 수 있다¹³⁾. 출생시 신기능, 혹은 사구체여과율이 성인치의 약 1/3에 해당함에 따라 약물의 배설도 저하되어 있으나 생후 3-5개월에 성인치에 도달한다.

이렇게 여러 가지의 측면에서 소아에서의 약물요법이 성인에서와 다른 점을 감안할 때 성인을 대상으로 얻은 약물동태학 및 약력학적 정보만을 토대로 소아에서 약물요법을 시행할 경우 많은 부작용이 생길 수 있으리라는 것은 분명한 일이다. 실제로 소아에서의 약물 부작용의 빈도는 성인과 비슷한 3-5%이며 전체 소아 입원건수의 약 2%에 해당한다^{17,18)}. 그러나 신생아 집중

Fig. 2. Metabolism patterns of theophylline(left column) and diazepam(right column) at different developmental stages; from top to bottom, a premature neonate, a full-term neonate, a prepubertal child, and an adult. The numbers indicate the percentage of metabolites retrieved in the urine. (Data from Sereni et al.¹⁴, Bonati et al.¹⁵, and Gryhiel and Birkett¹⁶)

치료실에서의 약물 부작용의 빈도는 11-30%로서 놀랄만큼 빈번함을 알 수 있다¹⁹). 이는 성인에서도 시판 전에 임상 시험을 통해 모든 부작용을 미리 찾아낼 수 없음을 물론, 소아를 대상으로 임상 시험을 시행하지 않는 경우는 그나마도 확인을 할 기회가 없다. 이에 따라 최적 치료를 하기 위한 한 방편으로 치료약물 모니터링 (therapeutic drug monitoring, TDM)을 시행하는데 이미 70년대 초반부터 aminoglycoside, vancomycin, theophylline과 같은 소수의 약물은 소아에서의 약물동태학 연구를 통해 얻어진 정보가 임상에 응용되고 있는 실정이다²⁰). 또한 TDM을 시행함에 있어서도 각 연령별 또는 각 개인별 특성을 고려해야 한다. 예를 들어 phenobarbital의 치료 농도의 범위는 성인에서는 20-

40 $\mu\text{g/ml}$ 인데 반해 신생아에서는 성인보다 높은 20-60 $\mu\text{g/ml}$ 로서 다르게 나타남을 볼 수 있다²¹).

그러므로 약물 요법의 최적화를 위해서는 소아에서 약물의 체내 변화의 차이를 아는 것이 필수적이며 개인차를 고려하여 원하는 효과를 얻기 위하여 약 용량을 결정하는 기법을 사용할 수 있다²²).

결론적으로 소아에서 약물 요법을 최적화 하기 위해 필요한 지식은 소아를 대상으로 약물동태학적 및 약력학적 연구를 시행해야만 얻어질 수 있으므로 소아에서의 연령별 특성을 고려하여 제대로 계획된 임상 시험이 필요하며 이를 활성화시키기 위한 노력이 요구된다.

Reference

- 1) American Academy of Pediatrics : *Statement by the AAP for the Senate Labor and Human resources Committee and House Subcommittee on Health and Environment for Hearings on Senate and House, submitted on Mar 7, 1996*
- 2) Yaffe SJ, Aranda JV : *Introduction and Historical Perspectives. In Yaffe SJ, Aranda JV (eds) : Pediatric Pharmacology-Therapeutic Principles in Practice. 2nd ed. W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1992, pp3-9*
- 3) Grahame-Smith DG, Aronson JK : *Oxford Textbook of Clinical Pharmacology and Drug Therapy. 2nd Ed. Oxford University Press, Oxford, 1992, pp137-146*
- 4) Jonsen AR : *Research Involving Children : Recommendations of the National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. Pediatrics 62:131-136, 1978*
- 5) British Paediatric Association Working Party on Ethics of Research in Children : *Guidelines to aid ethical committees considering research involving children. Arch Dis Child 55:75-77, 1980*
- 6) U.S. FDA : *Why FDA is Encouraging Drug Testing in Children. FDA Consumer Special Report on New Drug Development in the U.S. Jan 1995*
- 7) U.S. Department of HEW, PHS, FDA : *General Considerations for the Clinical Evaluation of Drugs in Infants and Children. (HEW Publication No. (FDA) 77-3041). Washington, U.S. Government Printing Office, 1977*
- 8) Radde IC : *Mechanisms of Drug Absorption and Their Development. In Radde IC, MacLeod SM(eds). Pediatric Pharmacology and Therapeutics. 2nd ed. Mosby, St. Louis, 1993, pp16-30*
- 9) Ghadially R, Shear NH : *Topical Therapy and Percutaneous Absorption. In Yaffe SJ, Aranda JV(eds): Pediatric Pharmacology-Therapeutic Principles in Practice. 2nd ed. W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1992, pp72-77*
- 10) Radde IC : *Drugs and Protein Binding. In Radde IC, MacLeod SM(eds). Pediatric Pharmacology and Therapeutics. 2nd ed. Mosby, St. Louis, 1993, pp31-42*
- 11) Rane A : *Drug Disposition and Action in Infants and Children. In Yaffe SJ, Aranda JV(eds): Pediatric Pharmacology-Therapeutic Principles in Practice. 2nd ed. W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1992, pp10-21*
- 12) Craft AW, Brocklebank JT, Gey EN : *The "grey toddler" chloramphenicol toxicity. Arch Dis Child 49:235-237, 1974*
- 13) Miller RP, Roberts RJ, Fischer LJ : *Acetaminophen elimination kinetics in neonates, children, and adults. Clin Pharmacol Ther 19: 284-294, 1976*
- 14) Sereni F, Morselli PL, Pardi G : *Postnatal development of drug metabolism in human infants, in Bossart H, Cruz JM, Huber A, Prodhon LS, Sistek J(eds): Perinatal Medicine. Bern, Hans Huber Publishers, 1972, pp63-67*
- 15) Bonati M, Latini R, Marra G, Assael BM, Parini R : *Theophylline metabolism during the first month of life and development. Pediatr Res 15:304-308, 1981*

- 16) Grygiel JJ, Birkett DJ : *Effect of age on patterns of theophylline metabolism. Clin Pharmacol Ther* 28:456-462, 1980
- 17) Leary PM : *Adverse reactions in children : Special considerations in prevention and management. Drug Safety* 6:171-182, 1991
- 18) Mitchell AA, Lacouture PG, Sheehan JE : *Adverse drug reactions in children leading to hospital admission. Pediatrics* 82:24-29, 1988
- 19) Buck ML : *A basic guide for reporting adverse drug reactions. Pediatr Pharmacother* 1 : 1995
- 20) Tange SM, Grey VL, Senecal PE : *Therapeutic drug monitoring in pediatrics: A need for improvement. J Clin Pharmacol* 34:200-214, 1994
- 21) Gilman JT, Gal P : *Pharmacokinetic and pharmacodynamic data collection in children and neonates: A quiet frontier. Clin Pharmacokinet* 23:1-9, 1992
- 22) Reed MD, Blumer JL: *Therapeutic drug monitoring in the pediatric intensive care unit. Pediatr Clin North Am* 41:1227-1243, 1994