의약품의 동등성/대체 조제

순천향대학교 의과대학 임상약리학교실

손 동 렬

Abstract

Therapeutic Equivalence/Generic Substitution

Dong-Ryul Sohn

Department of Clinical Pharmacology, Soonchunhyang University College of Medicine, Chonan, Korea

Many drugs are marketed by more than one pharmaceutical manufacturer. Because of the plethora of drug products containing the same amount of active drug, physicians, pharmacists, and others who prescribe, dispense, or purchase drugs must select generic products that produce an equivalent therapeutic effect to the brand product. Bioequivalent drug products are pharmaceutical equivalents that have similar bioavailability when given in the same molar dose. Therapeutic equivalents are drug products that contain the same therapeutically active drug that should give the same therapeutic effect and have equal potential for adverse effects under conditions set forth in the labels of these drug products. Therapeutic equivalent drug products must be (1) safe and effective, (2) pharmaceutical equivalents, (3) bioequivalent, (4) adequately labeled, and (5) manufactured in compliance with current good manufacturing practices. Generic substitution is the process of dispensing a different brand or unbranded drug product in place of the prescribed drug product. The substituted drug product contains the same active ingredient or therapeutic moiety. This process requires the physician's permission.

KEY WORDS : Therapeutic equivalence · Bioequivalence · Generic substitution.

정부는 2000년 7월 1일부터 의약품업을 추진하기 위하여 기본계획을 수립하고, 시행방안을 마련하여 법정기한 내 시행을 목표로 추진하고 있다. 합리적인 의약품업 제도는 전문의약품에 대하여 의사의 처방 없이 약국에서의 구입을 제한하고 의사는 처방을, 약사는 조제를 각각 전문적으로 담당함으로써 의약품의 오·남용과 약화사고를 사전에 예방하고, 과잉투약을 방지하여 약제비의 상승을 억제하는 등 국민건강을 증진시키고 의료비를 절감하기 위한 제도이기는 하다. 그러나 의약품은 품목마다 약리효과와 부작용 발현 정

도에 차이가 있어 각 의약품의 안전성 및 유효성 차이에 대한 평가가 선행되어야 하며 이에 따라 의사의 처방이 반드시 필요한 치료제나 심각한 부작용의 위험이 있는 의약품에 대해서는 전문적인 관리가 필요하다. 이러한 근본적인 의약품 관리 개념은 현실적으로 의약품의 원개발사 제품(original drug)에 대해서 뿐 아니라 특허기간 만료 후의 copy제품(generic drug)의 약효 동등성 검증 또는 대체 투여 가능성정도 해당된다. Generic drug에 관한 문제는 1970년대에 무분별한 generic 약품으로의 대체에 의해 digoxin,

교신저자 : 손동렬

소 속 : 순천향대학교 의과대학 임상약리학교실

주 소 : 충남천안시 쌍용동 366-1 ☎ 300-090

전 화 : (041) 570-2450 FAX : (041) 572-8995 E-mail : drsohn@sch.ac.kr

그림 1. 4개의 digoxin 제품 0.5 mg을 4명의 자원자에게 경구 투여한 후 digoxin의 최고혈중농도. A 회사의 제품과 B회사의 B2제품과는 약 7배의 차이, 같은 회사제품 B1과 B2간에는 4배 이상의 최고혈중농도차이가 있음을 볼 수 있다.

phenytoin의 부작용 빈도 병발이 문제가 되었으며, 1971년 미국의 뉴욕시립병원 내과에서 3개 제약회사의 0.5 mg digoxin 제품을 자원자에게 교차시험(cross-over study)한 결과, 제품에 따라 digoxin의 최고혈중농도가 약 7배의 차이가 있었고 같은 회사 제품 중에서도 lot에 따라 4배 이상의 혈중농도차이가 있음을 즉, 동일 성분의 약물도 제법, 제형에 따라 생체이용률의 차이가 약물의 부작용에 문제가 될 수 있음이 알려졌다(그림 1). 그 이후로 각 제약회사들은 digoxin의 제품화에 만전을 기울였으며 미국의 FDA는 약물의 생체이용률(bioavailability) 검토에 관한 지침을 만들었고 “생물학적 동등성(bioequivalence)”이란 개념이 생겼다. 국내에서도 최근의 ‘의약분업안’에서 중요한 과제로 부각된 ‘대체조제’에 대해서는 논란이 많다. 시안에서는 의약분업 실시 이전에 약효동등성 확보를 반드시 완료해야 하고, 동등성을 재입증하는 시험과정에서 기준에 미달하는 제품은 품

목허가를 취소한다고 한다. 따라서 본 장에서는 대체조제 및 약효동등성과 이를 입증하는 방법에 관해서 살펴보고자 한다.

대체 조제

대체조제(generic substitution)란 의사의 상품명 처방에 대하여 약사가 조제시 약효가 동등하다고 인정되는 타 회사 제품으로 바꾸어 조제하는 것을 말한다. 우리보다 먼저 의약분업을 실시한 미국, 유럽, 캐나다와 같은 선진국에서는 대체조제와 관련하여 많은 논란이 있었다. 미국의 한 조사에 따르면 현재 전체 처방의 10-20% 정도가 대체조제되고 있다고 한다. 대체조제에 관한 많은 외국의 규정들이 있으며, 일부 국가에서는 약사가 의사의 사전동의를 얻어야 하는 경우도 있으며, 일부는 의사가 ‘대체조제 불가’라는 단서를 붙이지 않으면 대체조제할 수 있다. 그러나, 어느 경

그림 2. 생물학적 동등성의 다양한 개념.

우이든 약효동등성(therapeutic equivalence)이 입증된 제품(상품, 품목)에 한하여 대체조제를 허용하는데, 이는 제조사 간의 차이에 의한 치료실패나 독성 발현 등의 문제를 최소화하려는 것이다. 약효동등성 규정 이전에는 제품의 표시 성분, 함량 및 제형이 동일함에도 불구하고 대체조제로 인한 많은 문제가 발생하였다. 이에 선진국에서는 관련 규정을 제정하여 예방에 노력하고 있으며, 최근에는 집단 생물학적동등성(population bioequivalence), 개별 생물학적동등성(individual bioequivalence) 등 더욱 엄격한 규정을 제정하고 있다(그림 2). 이런 노력에도 불구하고 약효동등성 규정을 통과한 복제 의약품(generic product)으로 대체조제했음에도 불구하고 여러 의약품에서 대체조제의 치료실패를 보고하고 있다. 선진국에서 대체조제의 주요 목적은 약품 미구비로 인한 환자 불편의 해소보다는, 비용이 저렴한 복제 제품(generic product)을 사용함으로써 환자부담을 낮추는 데 있었다. 우리나라도 현재 이와 관련한 규정들을 제정 중이나 경제 논리나, 잘못된 애국심으로 환자의 건강에 위험을 주는 규정이 되어서는 안되며 과학적이고

도, 윤리적인 규정을 마련해야 할 것이다.

약효 동등성

2000년 1월 5일 식품의약품안전청에서 고시한 ‘의약품동등성시험관리지침’(65601-217호)은 2000년 7월 1일 의약분업시행 이전에 약효동등성을 확보하겠다는 목표로 대부분의 복제품목에 대하여 비교용출시험 만으로 대체조제를 허용하게 하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

1. 약효동등성의 정의

대체조제는 약효동등성이 입증된 품목으로 한정하는 것은 이미 인정된 사실이다. 약효동등성은 이미 학술적으로는 규정에서든 널리 사용되는 용어이며, 미국 FDA는 다음과 같이 정의하고 있다.

약효동등성 제품은 다음의 조건을 모두 만족할 때이다.

- 1) 안전성, 유효성이 입증된 것(safe and effective)
- 2) 제제학적으로 동등할 것(pharmaceutical equivalent)
 - 약효성분이 동일 함량들어 있으며, 제형 및 투여경로가 동일할 것
 - Strength, quality, purity, identity 가 규정에 맞을 것
- 3) 생물학적으로 동등할 것(bioequivalent)
 - 생물학적동등성에 잠재적 문제를 일으킬 만한 성분을 함유하고 있지 않으면서 in vitro 조건을 만족하거나
 - 생물학적동등성에 잠재적 문제를 일으킬 만한 경우, 생물학적동등성 기준을 만족할 것
- 4) 적절히 라벨링(제품 표시)되어 있을 것
- 5) CGMP(Current Good Manufacturing Practice)를 만족할 것

그러나, 현 지침안은 '의약품동등성'이라는 용어를 사용하고 있으며, 여기에 대한 아무런 정의가 없다. 단지 '의약품동등성 시험'에 대해서는 정의하고 있는데 '그 성분, 함량 및 제형이 동일한 두 제제에 약효의 동등성을 입증하기 위해 실시하는 생물학적 동등성 시험, 비교용출시험 등의 생체내의 시험을 말한다.' 라고 하여 '의약품동등성'이 곧 '약효동등성'임을 암시하고 있다. 그런데, 혹자는 의약품동등성을 영어의 pharmaceutical equivalence(제제학적)와 동일하다고 간주할 수 있으므로, 용어의 혼선을 피하기 위해서는 '의약품동등성' 보다는 '약효동등성'이라는 용어를 사용하여야 한다. 또한 약효동등성은 하나의 '시험'이 아니며, 여러 시험으로 구성될 수 있고, 생물학적동등성 등의 개별 해당시험은 이미 정의된 명칭이 부여되어 있으므로 '약효동등성 시험'이라는 용어는 불필요하고 또한 혼선을 초래할 수 있다. 지침의 명칭도 '의약품동등성시험 관리지침'이 아니라 '약효동등성 관리지침'이라 함이 타당하다.

2. 약효동등성 입증의 대상

약효동등성에 대한 정보는 약사가 시행하는 대체조제뿐 아니라 의사의 대체처방에도 사용된다. 일반약인 경우에도 의사가 처방하든지, 구매자가 선택하게 되는 데 이때 약사는 처방은 아니지만 조언을 해주는 경우가 있을 것이다. 미국의 경우처럼 전문의약품 뿐만 아니라 일반약품의 약효동등성에 대한 자료가 공개되어 있다면 대체처방이나 조제시 이를 참고로 저렴한 비용이나 가용한 약품을 사용함으로써 치료의 편의를 도모할 수 있다. 따라서, 이러한 약효동등성의 입증대상은 전문, 일반 의약품의 구분이 필요없으며, 투여경로, 흡수여부에 상관없이 허가된 모든 제품(품목)에 대하여 약효동등성 입증이 가능하여야 할 것이다. 패취, 플라스틱 등의 경피제제, 분무 흡입제제 중에 혈중 농도를 측정하는 것이 용이하지 않으며, 그 약효동등성의 입증방법이 경구제제와는 다를 것이므로 미국의 경우처럼 별도의 지침을 마련하여야 할 것이다.

3. 생물학적동등성시험과 비교용출시험

생물학적동등성시험은 어떤 두 제품이 같은 정도(extent, amount)와 속도(rate)로 전신순환에 도달하는가를 측정하는 것이다. 약물이 전신순환에 도달하기 위해서는 경구투여의 경우 분해(disintegration)와 용출(dissolution) 과정을 거쳐 용액(solution)상태가 된 후 장점막을 투과(permeation)한다. 장점막에서 흡수된 후에도 간, 폐를 지나면서 초회통과 효과(first pass effect)에 의해 상당량이 대사된다. 약물이 흡수되기 위해서는 반드시 액체(solution)상태이어야 하며, 이런 흡수가능한 전단계까지를 생체외에서 시험하는 것이 용출시험(in vitro dissolution test)이다. 따라서, 두 제품의 약효성분이 동등한 양이 동등한 속도로 전신순환에 도달하였다는 것은 약효가 어느 정도 같다는 것이 보장될 수 있지만, 흡수에는 많은 복잡한 변수들이 작용하고, in vivo 상황과 in vitro 상태는 많은 면에서 차이가 나므로 흡수 전단계

인 용출시험(in vitro dissolution test)으로는 두 제제의 생물학적동등성을 입증할 수 없다는 점은 이미 여러 교과서에 나와 있으며, 학술적으로도 이미 널리 알려진 사실이다. 미국 FDA에서도 high solubility, high permeability, rapid dissolving 조건을 엄격히 정해놓고 이를 모두 만족하는 제품(품목)에 한해서만 생물학적동등성 시험을 면제해주고 있다. 따라서, 생물학적동등성시험의 대상은 투여경로, 제형에 상관없이 전신순환에서 측정될 수 있는 모든 허가된 품목을 대상으로 한다. 식품의약품안전청고시 고시 제1998-86호 '생물학적동등성시험 기준 (1998년 8월 26일 개정)'에 명시되어 있는 생물학적동등성 시험면제 기준 외에 비교용출시험으로 생물학적동등성 시험을 면제하려면 과학적 사실에 근거한 규정을 마련하여 해당 품목만 면제해주어야 할 것이다.

그러나, 현 지침은 미국 FDA 약효동등성 코드 B를 부여받은 제품들이 가진 성분을 우리나라 회사가 제품을 만든 경우에 한하여 생물학적동등성을 시험하도록 규정하고 있다. 예를 들어 미국에서 코드 A를 받은 제품의 성분으로 다시 복제품을 만드는 경우에도 기준제제(Reference List Drug)와 생물학적동등성 시험을 거쳐야 하는데, 현 지침안은 이런 것을 모두 면제해주고 있는 것이다. 미국 FDA에서 부여하는 약효동등성 코드는 크게 둘로 나뉘는데 A와 B코드이다. A코드는 약효동등성이 입증된 품목에 부여하는 것이고, B코드는 약효동등성이 입증되지 않은 품목(성분이 아님)에 부여하는 것이다. 즉 약효동등성 코드는 성분이 아니라 개별품목에 부여하는 것으로 성분에 상관없이 모든 복제품에 해당된다.

4. 약효동등성의 관리

미국의 경우 제조회사가 생물학적동등성시험자료, 제제학적 자료, GMP자료 등 약효동등성에 관한 자료를 제출하면 여기에 대하여 약효동등성 코드(Therapeutic Equivalence Evaluation Code)를 부여하고 공개하고 있다. 의사나 약사는 이러한 정보를 바탕으

로 대체처방과 대체조제를 하고 있다. 그러나, 우리의 경우 관련 지침이 전무하다. 따라서, 여기에 대한 지침을 마련하고 시행하는 것이 우선되어야 할 것이다. 이 지침 시행후에 복제의약품을 생산하는 경우 기준제제와의 약효동등성을 입증하는 경우에만 품목허가 되어야겠지만, 이미 시판허가증인 많은 복제의약품의 경우에는 이미 다년간 사용되었고, 행정적으로 법적으로도 시판허가를 취소하는 것이 불가하므로 시판은 계속 하되 추후에 약효동등성을 입증한다면 약효동등성 코드를 부여하고 대체조제를 허용함이 의학적, 윤리적으로도 합당할 뿐만 아니라 현실적이다. 현 지침은 약효동등성 입증자료를 비교용출시험대상 품목은 2000년 4월 15일까지, 생물학적동등성시험대상 품목은 2001년 12월 31일 까지 제출하도록 하고 있으나, 이 이후에 제출하는 자료라 해서 약효동등성을 인정해주지 않을 하등의 이유가 없는 것이다. 또한 이때까지 입증하지 않았다고 해서 품목허가를 취소하는 것도 부당할 것이다. 미국 FDA USP DI에 등재되어 있는 약품중 일부는 아직 약효동등성 코드를 부여받지 못했음에도 불구하고 계속 시판되고 있는 것도 같은 이유이다.

이외에도 서방형제제의 생물학적동등성 판정기준이 없으며, 경피제제, 흡입, 분무제 등의 약효동등성에 관한 규정들도 없으므로 이에 대한 제정이 필요하다.

마지막으로 생물학적동등성 시험도 인체를 대상으로 하는 연구이므로 선진국처럼 ICH guideline과 식품의약품안전청 고시 '의약품임상시험관리기준(KGCP)'을 준수하면서 IRB가 설치되어 있는 임상시험기관에서만 실시하도록 하여야 한다.

참 고 문 헌

1. Culkin TT, Mendell S. 'Generic substitution' in New Jersey 1979-87. *Am Pharm* 1989;NS29: 25-30
2. Welty TE, Pciekring PR, Hale BC, Arazi R. Loss of seizure control associated with generic substitution of carbamazepine. *Ann Pharmacol*

- ther* 1992;26:775-777
3. Rietbrock N, Fischer A, Menke G. *Bioequivalence of generic drugs and substitution : example of depot verapamil.* *Z Kardiol* 1987;76: 621-625
4. 보건복지부공고. 약사법 시행규칙중 개정령(안) 입법예고. 2000. 1. 20
5. US DHHS FDA CDER. *Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations.* 19th ed. 1999. 11
6. US DHHS FDA CDER. *Guidance for industry: Placing the Therapeutic Equivalence Code on Prescription Drug Labels and Labeling* 1998. 12
7. Shargel L, Yu A. *Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics.* 4th ed. Appleton & Lange 1999
8. USA DHHS FDA CDER. *Waiver of in vivo bioavailability and bioequivalence studies for immediate release solid oral dosage forms containing certain active moieties/active ingredients based on a biopharmaceutics classification system.* 1999.1
9. 보건복지부 의약분업추진본부. 의약분업 이렇게 시행됩니다(의사용 설명자료). 보건복지부 1999. 12